



Confidor®
SL 200



Bayer tarafından keşfedilmiş ve geliştirilmiş olan Confidor SL 200, en zor şartlarda dahi en iyi ve güvenilir sonucu almanızı sağlar.

- Confidor SL 200, önerilen şekilde ve önerilen dozlarda uygulandığında, kullanıcıya, çevreye ve hedef dışı organizmalara karşı düşük risklidir.
- Bitkilerin suyu ve gübreyi daha etkili bir şekilde kullanmasını sağlar.
- Kuraklık, aşırı sıcak, hava kirliliği, toprak tuzluluğu gibi kimyasal ve fiziksel etkenlerin oluşturduğu stres şartlarında bitkilerin daha dayanıklı olmasına yardım eder.
- Uzun süreli etkisi ve kalıcı koruması sayesinde daha az miktarda ilaç kullanılır. Böylece çevreye daha az kimyasal salınır.



Bayer

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.

FSM Mah. Balkan Cad. No: 53
Ümraniye 34770 İSTANBUL
Telefon: 0216 528 36 00
Faks: 0216 528 37 87
www.cevresagligi.bayer.com.tr



Science For A Better Life

**Palmiyelere
yaşam
hakkı!**



Palmiyelere yaşam hakkı!

Palmiye tarımı yapılan tüm ülkelerde, palmiye türlerinin en önemli zararlısı olan Kırmızı Palmiye Böceği (Rhynchophorus ferrugineus) önlem alınmadığı ve mücadele edilmediği takdirde telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olmaktadır. Son yıllarda ülkemizde de problem olan zararlı tüm Akdeniz , Ege ve Marmara sahil şeridinde yayılış göstermektedir.

Confidor SL 200, aktif maddesi Imidacloprid'in sahip olduğu benzersiz özellikleri sayesinde;

- Kırmızı Palmiye Böceği ile mücadelede en etkili çözüm olduğu, zararının görüldüğü ülkelerde yapılan sayısız çalışma ve uygulamalar ile kanıtlanmıştır.
- Sistemik etkilidir, ilacın temas ettiği yerlerin yanı sıra, bitki öz suyu ile taşınarak palmiyenin tamamına dağılarak etkisini gösterir.
- Uzun süreli zararlı kontrolü sağlar.
- Farklı uygulama seçenekleriyle (gövde enjeksiyonu, kök boğazı uygulaması) farklı ihtiyaçlara cevap verir.
- Bitkilerin kendi savunma mekanizmalarını güçlendirerek hastalıklara karşı daha dayanıklı olmalarını sağlar.
- Bitkilerin gelişimini hızlandırarak daha sağlıklı bir kök yapısı ve yeşil aksam oluşturmalarına yardımcı olur.



Kırmızı Palmiye Böceği (larva)



Kırmızı Palmiye Böceği (ergin)



Zarar görmüş palmiye ağaçları

Ugulama Şekli ve Kullanım Dozu

Confidor SL 200, Kırmızı Palmiye Böceği'ne karşı iki farklı şekilde uygulanabilir.

1 Gövde enjeksiyonu uygulaması:

Ağacın gövdesine yerden 1-1,5 m yükseklikte, 0,5-1 cm çapında, 10 cm derinlikte, 30-45 derecelik açı ile matkapla 10-15 cm uzunluğunda ortalama 4 adet delik açılır. 35 ml Confidor SL 200 eşit olarak deliklere enjektörle verilir.



2 Kök boğazı uygulaması:

Ağacın gövdesinin toprakla birleştiği kısmın hemen etrafına 20-30 cm derinliğinde çukur açılarak buraya 35 ml ilaç, 10-20 lt. su ile karıştırılıp dökerek uygulanır. Uygulama öncesinde ön sulama yapılarak toprağın suya doyurulması tavsiye edilir.

Yeni bulaşmaları engellemek amacıyla yapılan insektisit uygulamaları yaklaşık olarak 25-30 günde bir tekrarlanmalıdır. Toprakta bitki kök boğazına ya da gövdeye enjeksiyon şeklinde yapılan uygulamalar bitkinin iletim demetlerinin daha iyi çalıştığı bahar ve yaz aylarında yapılmalıdır.

