

ORIGINAL

ZOOM[®] 10SC

Akarisit (Kırmızı Örümcek İlacı)

NARENCİYEDE ETKİN VE KESKİN KIRMIZI ÖRÜMCEK KONTROLÜ

**ANİ ETKİLİDİR VE UZUN SÜRE KORUMA SAĞLAR
YUMURTA, LARVA VE NİMF ETKİSİ VARDIR
ZARARLININ GELİŞİMİNİ ENGELLEYEREK ETKİ EDER
BİRÇOK ZİRAİ İLAÇ VE GÜBRE İLE KARIŞTIRILABİLİR**



ZOOM® 10SC

Akarisit (Kırmızı Örümcek İlacı)

ZOOM 10 SC adlı bitki koruma ürünü, kontak ve translaminar etkiye sahip bir akarisitir. Kırmızı örümceklerin yumurta ve nimflerine karşı dönem değiştirmelerini engellemek suretiyle etki gösterir. Kırmızı örümcek erginlerine etkili değildir. Yumurta ve nimf dönemlerinde etkilidir. Yapraklarda ilaçlamaya maruz kalan yumurtalar açılmaz. İlaçla temas eden ergin dişinin bıraktığı yumurtalar açılmaz. Kırmızı örümcek popülasyonunun düşük olduğu erken dönemlerde kullanılmalıdır. Böylece daha uzun bir etki sağlanır. Etki şeklinden dolayı ilaçlamadan 3-4 gün sonra etki göstermeye başlar ve 30 güne kadar koruma sağlayabilir.

Kullanılacağı Bitki ve Zararlı Organizmalar:

Bitki	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Elma	Avrupa kırmızı örümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	25 ml/100 l su. (Yumurta, larva, nimf)	14 gün
Domates	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	35 ml/100 l su (Larva, nimf)	3 gün
Pamuk	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/da (Yumurta, Larva, nimf)	21 gün
	Kırmızı örümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	50 ml/da (Yumurta, Larva, nimf)	21 gün
Karpuz	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/da (Larva, nimf)	3 gün
Turunçgil	Turunçgil kırmızı örümceği (<i>Panonychus citri</i>)	25 ml/100 l su (Yumurta, larva, nimf)	21 gün
Bağ*	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 l su (Yumurta, larva, nimf)	7 gün
Biber (Sera)	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	35 ml/100 l su (Larva, nimf)	3 gün
Çilek (Tarla)	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	35 ml/100 l su (Larva, nimf)	1 gün
Hıyar (Tarla ve Sera)	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	35 ml/100 l su (Larva, nimf)	3 gün
Mısır	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25ml/da (Yumurta, larva, nimf)	1 gün
Şeftali	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 l su (Yumurta, larva, nimf)	3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.



AMC-TR