

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj Numarası :
Ruhsat Tarihi ve Numarası : 12.06.2014/9692

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son
			Uygulama ila hasat arası Süre
Bağ*	Bağ Mildiyözü (<i>Plasmopara viticola</i>)	75 ml / 100 l su	21 gün
	Külleme (<i>Erysiphe necator</i>)	75 ml / 100 l su	
	Olu Koli (<i>Phomopsis viticola</i>)	75 ml / 100 l su	
Hıyar	Kabakgillerde Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	60 ml / 100 l su	3 gün
	Kabakgillerde Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Podosphaera xanthii</i>)	75 ml / 100 l su	3 gün
Kornişon	Kabakgillerde Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	60 ml / 100 l su	3 gün
	Kabakgillerde Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Podosphaera xanthii</i>)	75 ml / 100 l su	3 gün
Kabak	Kabakgillerde Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Podosphaera xanthii</i>)	75 ml / 100 l su	3 gün
Domates (Tarla)	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	75 ml / 100 l su	3 gün
	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	75 ml / 100 l su	
Karpuz	Alternaria Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria cucumerina</i>)	75 ml / da	3 gün
Biber (Sera)	Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	75 ml / 100 l su	3 gün
Çeltik	Çeltik yanıklığı (<i>Pyricularia oryzae</i>)	100 ml / da	28 gün
Çilek	Çilekte antraknoz (<i>Colletotrichum fragariae</i> , <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> , <i>Colletotrichum acutatum</i>)	75 ml / da	1 gün
Bezelye	Bezelye Mildiyözü (<i>Peronospora viciae</i>)	80 ml/da	7 gün
Elma	Elma karalesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	75 ml / 100 l su	7 gün
Armut	Armut karalesi (<i>Venturia pirina</i>)	75 ml / 100 l su	7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmamalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden ilağı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra Uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

AGRIMATCO TARIM SAN. ve TİC. A.Ş



Agrimatco

WAIPA

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	C3,11	FUNGİSİT (Mantar İlağı)
-------	-------	-------------------------

250 g/l Azoxystrobin

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey

yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süreyle

insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye

edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA

KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının 1/4'ün kadar temiz

su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama

tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel : 114

Net Miktar :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

İÇİNDEKİLER: Azoxystrobin, DL-propandiol-(1,2)

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H300+H330: Yutulduğunda veya solunduğunda öldürücüdür.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P273: Çevreye salıverilmesinden kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz

koruyucu kullanınız.

P284: Solunum koruyucu giyin.

P391: Döküntüleri toplayınız.

P501: İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET
TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ**

KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ



Burhan ŞİMŞEK
Ziraat Yüksek Mühendisi

**AGRIMATCO TARIM
SANAYİ VE TİC. A.Ş.**
Çağlayan Mah. Barınaklar Bulvarı
Sicilya Polat Apt. No: 41/1 ANTALYA
Tel: 0 242 324 13 15 Faks: 0 242 324 19 69
KURUMLAR V.D.: 008 070 0581

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

22 Temmuz 2026



WAIPA

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	C3,11	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	-------	-------------------------

250 g/l Azoxystrobin

ZEHRİLENME BELİRTİLERİ:
Genel zehirlenme belirtileri görülür.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz: Gözleri, göz kapakları açık bir şekilde 15-20 dk boyunca zaman zaman alt ve üst göz kapaklarını kaldırarak bol miktarda su ile yıkayın. Gerekirse doktora başvurun.
Cilt: Vücut ürünüle temas ederse bol su ve sabun ile 15-20 dk yıkayın ve uygun bir cilt temizleyicisi kullanın. Kirli giysileri akan su altında hemen çıkartın. Yeniden kullanmadan önce giysileri yıkayın. Gerekirse doktora başvurun.
Yutma: Ürün yutulmuş ise hastanın ağzını bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Doktor tarafından söylenmedikçe hastayı KUSTURMAYIN. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Tıbbi destek alın.
Soluma: Etkilenen kişiyi temiz havaya çıkarın. Solumun durmuş veya yavaşlamış ise suni solumun uygulayın, taşımak için sabit bir yan pozisyona getirin. Gerekirse oksijen takviyesi yaparak en yakın sağlık kurumu sevk edin. Hastada bilinç kaybı görülürse tıbbi yardım isteyin.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Mideyi, mide muhteviyatının solumun yollarına kaçmamasına dikkat ederek yıkayınız.

ULUSAL ZEHRİ MERKEZİ (UZEM) Tel : 114



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

22 Temmuz 2026

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
-Bahçalara zehirlidir. Yeraltı ve verüsti su kaynaklarına bulaştırmayınız.
-Evciil hayvanları ilacli sahadan uzak tutunuz.
-Yem ve gıda maddelerini ilacli kirlitemeyiniz.
İlaçlama sırasında mümkün olduğunda ilacli temastan sakınız.
-Boş ambalajları başka bir gaye ile kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda, orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı, ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

AMC Xinjiang CO. LTD.,

Adres: B3-242 Chemical Market, North Road No 226, Two East Lane, High (new) District, Xinjiang Province, Urumqi City, ÇİN
Tel: +86-0991-2838389, Fx: +86-0991-2838211

ÜRETİM TESİSİ:

JIANGSU FLAG CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD.,
No.309, Changfenghe Road, Nanjing Chemical Industrial Park, Nanjing, ÇİN 210047
Tel: +86-25-84738126
Fax: +86-25-86890135

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRIMATCO Tarım San. ve Tic. A.Ş.
Çağlayan Mh. Barınaklar Bulvarı Sıdkı Polat Apt.
No: 41 / 1 ANTALYA - TÜRKİYE www.amc-tr.com
Tel: +90 242 3241315 Fax: +90 242 3241969

Burhan ŞİMŞEK
Ziraat Yüksek Mühendisi

AGRIMATCO TARIM
SANAYİ ve TİC. A.Ş.
Çağlayan Mh. Barınaklar Bulvarı
Sıdkı Polat Apt. No: 41/1 ANTALYA
Tel: 0242 324 13 15 Faks: 0 242 324 19 69
E-Posta: 008 070 0581

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ-Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Bağ-Küllemesi: *Erysiphe necator* 1. İlaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde 2. İlaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde

3. İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde, 4. ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Bağ-Ölükol:Dormant dönem ilaçlaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan (tomurcuk patlamasından) 3-4 hafta önce dormant dönem uygulaması yapılır.

Yeşil aksam ilaçlaması: Vejetasyon döneminde aşağıdaki programa göre yapılır.

1. uygulama: Gözlerin uyanma (tomurcuk patlaması) başlangıcında,

2. uygulama: Sürgünler 8-10 cm uzunluğa ulaştığı dönemde,

3. uygulama: Çiçeklenme döneminden hemen önce (çiçek salkımlarının belirmediği dönemde),

4. uygulama: Çiçeklenme sonu tane seti oluşumu başlangıcında yapılmalıdır.

Hıyar, Kornişon Kabakgillerde Mildiyö: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile başlar. Hastalığın şiddetine göre tekrarlanır. İlaçlamaların bitkinin her tarafını özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Hıyar,Kornişon,Kabak Kabakgillerde Külleme Hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 C'nin üstünde ve orantılı nemin de %50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir.

Domates Mildiyö: Hastalığın her yıl görüldüğü ve zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C ve orantılı nemin en az % 80 olması halinde başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmeyen alanlarda ise ilaçlamaya çevrede ya da tarlada hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır

Domates Erken Yaprak Yanklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Biber (Sera) Külleme: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilmelidir.

Üretim döneminde hastalığın devam etmesi halinde arka arkaya 2 uygulama yapılabilir.

Karpuz Alternaria Yaprak Yanklığı: Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamalar şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Çeltik Yank Hastalığı: Yeşil aksam ilaçlamalarında hastalık ilk görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Gerekli hallerde kullanılan ilacın etki süresi göz önüne alınarak ikinci ve üçüncü ilaçlamalar yapılmalıdır.

Çilekte Antraknoz: İlaçlamalara ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. İlaçlamadan 10 gün sonra 2.ilaçlama yapılmalıdır.

Bezelyede Mildiyö: Hastalığın her yıl görüldüğü üretim alanlarında günlük ortalama sıcaklığın 15°C ve nisbi nemin %80'nin üzerine çıkması durumunda ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmeyen alanlarda ise uygulamaya, çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır.

Elma Karalekesi: 1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır).

2. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı görüldüğünde)

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 4. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti

Armut Karalekesi: 1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır).

2. Uygulama: Beyaz rozet döneminde 3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak uygulanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

WAIPA adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup C3,11 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için WAIPA'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3,11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır.