

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası:

26.01.2022 / 12219

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	15 g/ 100 l su (Ergin, Nimf)	3 gün
Biber (Sera)	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	15 g/ 100 l su (Ergin, Nimf)	3 gün
Hıyar (Sera)	Yaprakbitleri (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>)	15 g/ 100 l su (Ergin, Nimf)	3 gün
Kornişon (Sera)			
Kabak (Sera)	Yaprakbitleri (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>)	15 g/ 100 l su (Ergin, Nimf)	3 gün
Şeftali	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	15 g/ 100 l su (Ergin, Nimf)	14 gün
Pamuk	Pamuk yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	20 g/da (Ergin, nimf)	21 gün

*Bir sezonda birden fazla uygulamayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesini deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içerisinde kullanınız.



AMC-TR TARIM SAN. ve TİC. A.Ş



HACHIMAN 50 WG

SUDA DAĞILABİLEN GRANÜL (WG)

GRUP	9C	İnsektisit (Böcek ilacı)
------	----	--------------------------

% 50 Flonicamid

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma

Bu ürün solunması halinde zararlı olarak sınıflandırılan bileşen içermez, ancak herhangi bir semptom görülmesi halinde kazazedeyi alandan uzaklaştırın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

14 Ekim 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
Flanicamid (ISO)

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P264: Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.

P301+P310: YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P280: Koruyucu eldiven /koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P501: İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığı ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Su altı kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Ürün yanabilir özellikte olduğundan ateşten uzak tutunuz.
- Rüzgârlı havada uygulama yapmayınız.
- Bitki koruma ürünü mahlûlün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Bekleme süresine uyunuz.
- Dökülmesi halinde üzerinde kum, toprak vs. gibi emici maddelerden serpin sonra süpürüp toplayın ve imha edin.

Burhan ŞİMŞEK

Ziraat Mühendisi

AMC-TR TARIM

SANAYİ TİC. A.Ş.

Çağlayan Mah. Barınaklar Bulvarı

Sıdıka Köktel Apt. No: 41/2 ANTALYA

Tel: 0 242 324 13 15 Faks: 0 242 324 19 69

GRUPLAR V.D.: 781 019 6358

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesini deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates, Biber, Hıyar ve Kabakta yaprakbiti: 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir.

Şeftali yaprakbiti: Ağaçlarda çiçek tomurcuklarının belirmesinden sonra yapılan kontrollerde 50 ağaçta 7 sürgünde bulaşıklık saptanırsa ilaçlama yapılır.

Pamuk: Fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, taraklanma döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında ilaçlamalara başlanması önerilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

HACHIMAN 50 WG adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup 9C olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **HACHIMAN 50 WG** ile aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı bir etki mekanizmasına sahip (Grup 9C harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

AMC-TR TARIM SAN. ve TİC. A.Ş.



HACHIMAN 50 WG

SUDA DAĞILABİLEN GRANÜL (WG)

GRUP	9C	İnsektisit (Böcek İlacı)
------	----	-----------------------------

% 50 Flonicamid

Yutma:

Hemen tıbbi yardım alınmalıdır. Doktor tarafından belirtilmediği sürece kusturmaya çalışmayınız. Kusma meydana gelirse, baş aşağıda tutulmalıdır. Bilinci yerinde olmayan kazazedeye ağız yolu ile herhangi bir şey verilmemelidir.

Ciltle temas:

Vücut ürünle temas ederse bol su ve sabun ile 15-20 dakika yıkayın ve uygun bir cilt temizleyicisi kullanın. Kirli tüm giysileri akan suyun altında hemen çıkartın. Yeniden kullanmadan önce giysileri yıkayınız. Gerekirse doktora başvurun.

Gözlerle temas:

Gözleri, göz kapaklarını açık bir şekilde 15-20 dakika boyunca zaman zaman alt ve üst göz kapaklarını kaldırarak ılık su ile yıkayınız. Hemen tıbbi yardım alınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Semptomlara göre tedavi uygulayın.

14 Ekim 2025

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

ADA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolaması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde oluşabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

Binhai Economic Development Area, Weifang City,
Shandong Province, ÇİN

Üretim Tesisi:

SHANDONG HUIMIN VANDA BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Jinan Plant Protection Technology Industrial Park, Hanmiao Town,
Shanghe County, Jinan City,
Shandong Province, ÇİN

RUHSAT SAHİBİ:

AMC-TR Tarım San. ve Tic. A.Ş.

Çağlayan Mah. Barınaklar Bulvarı

Sıdika Polat Apt. No: 41/2 Antalya-TÜRKİYE

Tel: +90 242 324 13 15 Fax: +90 242 324 19 69

Burhan ŞİMŞEK
Ziraat Yüksek Mühendisi

AMC-TR TARIM
SANAYİ ve TİC. A.Ş.
Çağlayan Mah. Barınaklar Bulvarı
Sıdika Polat Apt. No: 41/2 ANTALYA
Tel: 0 242 324 13 15 Faks: 0 242 324 19 69
KURUMLAR V.D.: 781 019 6358