

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve No.su : 20.08.2021/12021
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Kullanım dozu ve dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Domates (sera)	Kurşuni küf (Botrytis cinerea) Çökerten ve kök çürüklüğü (Fusarium spp., Sclerotinia spp., Phytophthora spp.)	75 ml/100 lt su 200 ml/da	7 gün 10 gün
Elma	Elma karalekesi (Venturia inaequalis)	100 ml/100 lt su	21 gün
Patates	Mildiyö (Phytophthora infestans)	50 ml/da	7 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALIBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates Kurşuni küf hastalığına karşı çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalı, hava koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak hastalık koşulları ortadan kalkıncaya kadar ilaçlamalara devam edilmelidir.

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

25 Kasım 2025

SCHELKOVO AGROCHİM TURKEY TARIM LTD.ŞTİ.

SHIRMA SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	C 5: 29	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	---------	-------------------------

500 g/l Fluzinam

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHA YA 2 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI

KESİNLİKLE YASAKTIR

- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4' ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHIRLENME BELİRTİLERİ:

Spesifik bir zehirlenme belirtisi yoktur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluması halinde: Kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes almasını sağlayın.

Deriyle temas etmesi halinde: Cildi bol su ve sabun ile yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın. Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

Göze temas etmesi halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

Yutulması halinde: Ağız şer ile temizleyin, kusturmayın. Kusma meydana gelirse hemen tıbbi yardım alın.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Net Miktar :
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER

Fluzinam

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H317** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H318** Ciddi göz hasarına yol açar.
- H332** Soluması halinde zararlıdır.
- H361** Muhtemelen fertilitiyi kısıtlayabilir veya çocuğa anne karnında zarar verebilir.
- H410** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

- P261** Dumanını solumaktan kaçının.
- P271** Sadece dışarda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
- P273** Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280** Koruyucu eldiven, kıyafet, göz/yüz koruyucu kullanın.
- P501** İçeriği ve kabı yerel/ulusal mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
- EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.
- P362+P364** Kirlenmiş giysileri çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- P391** Döküntüleri toplayın.
- EUH208** Alerjik reaksiyona yol açabilir.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara ve suda yaşayan canlılara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- Boş ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

Kenan Kuvşuncu
Genel Müdür
SCHELKOVO AGROCHİM TURKEY
TARIM LİMİTED SİRKETİ
Çiğdemir Mahallesi Çiğdemir Caddesi
No: 207A Avcılar - İST
Kuşhar V.D. 757 047 6183

SHIRMA SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	C 5 : 29	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	----------	-------------------------

500 g/l Fluazinam

Domates Çökerten ve kök çürüklüğüne karşı uygulama domates fidelerinin hemen dikiminden sonra damlama sulama ile yapılmalıdır. 2. ve 3. ilaçlamaya 15 gün aralıklarla devam edilmelidir. Uygulamadan önce damlama sulama ile 15 dakika temiz su ile sulama yapılmalı daha sonra bitki koruma ürünü ilave edilmiş su bitene kadar uygulamaya devam edilmeli ve sonra da 5 dakika temiz su verilmelidir.

Elma karalekesine karşı 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır),2.ilaçlama pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı görüldüğünde),3.ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 4.ve diğer ilaçlamalar ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda, kullanılan preparatların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Erken uyarı istasyonlarının bulunduğu alanlarda yerel duyurulara uyulmalıdır.
Patates-mildiyo Mildiyönün her yıl görüldüğü ve büyük zarar yaptığı üretim alanlarında, hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C veya en düşük sıcaklığın 10°C'yi bulması ile ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmeyen alanlarda ise ilaçlamaya başlamak için çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtilerinin görülmesi beklenmelidir. İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanmalı ve hava koşullarının devam etmesi durumunda 7-10 gün arayla uygulamaya devam edilmelidir.

SHIRMA SC hakkında bir şikayetiniz olması halinde il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

SHIRMA SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup C 5 : 29** olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **SHIRMA SC'** nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C 5 : 29 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması önerilmez.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

25 Kasım 2025

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, İmalatçıların ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçıların ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ:

JSC SCHELKOVO AGROHİM
Zavodskaya Str. 2, Schelkovo,
Moscow region, 141108
Russian Federation

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SCHELKOVO AGROCHİM TURKEY TARIM LTD.ŞTİ.
Cihangir Mah. Cıva Caddesi No:20 A
Avclar-İSTANBUL
Tel/Faks: 0 212 590 11 91



Kenan KUYUCUKLU
Genel Müdür
SCHELKOVO AGROCHİM TURKEY
TARIM LİMİTED ŞİRKETİ
Cihangir Mahallesi Cıva Caddesi
No: 20/A İstanbul - İST
Açılış Tarih: 01.07.2018
Açılış No: D. 757 047 9183