

İmal Tarihi :
Son kullanma Tarihi :
Ruhsat tarih ve No' su : 18.01.2024 / 12963
Şarj No :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu ve zamanı
Soya	Siriken (<i>Chenopodium album</i>) ✓ Kırmızı köklü tıllı kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) ✓ Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) ✓ Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) ✓ Demir dikenli (<i>Tribulus terrestris</i>) ✓ Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) ✓ Çakal kavunu (<i>Cucumis melo var. agrestis</i>) ✓ Benekli dancan (<i>Echinochloa colonum</i>)	9 g/da soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi olarak
Pamuk	✓ Imam pamuğu (<i>Abutilon theophrasti</i>) ✓ Dancan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) ✓ Semiz otu (<i>Portulaca oleracea</i>) ✓ Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) ✓ Bambul otu (<i>Chrozophora tinctoria</i>)	20 g/da pamuk ekiminden hemen sonra çıkış öncesi olarak
Portakal	✓ Kırmızı köklü tıllı kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) ✓ Siriken (<i>Chenopodium album</i>) ✓ Dancan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) ✓ Yabani hardal (<i>Sinaps arvensis</i>) ✓ Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) ✓ Semiz otu (<i>Portulaca oleracea</i>) ✓ Demir dikenli (<i>Tribulus terrestris</i>)	80 g/da çıkış öncesi toprağa karıştırılmadan

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ürün önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız. Dekara atılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 **SUMITOMO CHEMICAL**
Sumitomo Chemical Turkey Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

FLUMYZIN 50 WG

Grubu E;14 Herbisit (Yabancı ot ilacı)

%50 Flumioxazin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki Koruma Ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki Koruma Ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerindeki riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkartın. Belirtilerin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.
Yutma: Ağzı çalkalayın. Bilinci yerinde olmayan ağzı su ile temizleyin. Kusma meydana gelirse, hemen tıbbi yardım alın.
Ciltle temas: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi sabun ve bol su ile iyice yıkayın.
Gözlerle temas: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

18 Temmuz 2025



Net Miktarı : ... kg e
Azami Perakende Satış Fiyatı :
İÇİNDEKİLER
Flumioxazin, kaolin

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM İFADELERİ

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumaktan kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 Kabı uygun bir şekilde bertaraf edin.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- ✓ Bakidire zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulandırmaktan kaçınınız.
- Ürünü ambalajında, ağzı kapalı olarak saklayınız.
- Hazırlar hazırlamaz hemen kullanınız.
- İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firmamız, orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı doğabilecek sorunlardan mesuliyet kabul etmez.


YUSUF DEMİR
Geliştirme & Ruhsatlandırma Müdürü
Sumitomo Chemical Turkey
Kimya San. ve Tic. A.Ş.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

FLUMYZIN 50 WG, soya ve pamuk bitkisinde dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı soya ve pamuk tohumu ekiminden hemen sonra çıkış öncesi olarak uygulanır. Beklenen etkili sonuçların alınabilmesi için ekim öncesi iyi bir toprak işlemesi yapılmalı, toprak kesek ve ot ihtiva etmemelidir.

FLUMYZIN 50 WG, portakal bitkisinde dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı ilkbaharda çıkış öncesi kullanılır.

Topraktan etkili tüm herbisitlerde olduğu gibi toprakta yeterli nemin olması ya da uygulamadan sonra yeterli yağışın olması ürünün etkinliği için gereklidir.

Kum içeriği >%60 'dan fazla olan topraklarda, ürünün kotiledon aşamasına kadar çıkışı sırasında yoğun yağış meydana gelirse fitotoksisite riski vardır. Bu tip topraklarda kritik olan çıkış aşamasından kotiledon aşamasına kadar basınçlı veya yağmurlama sulamadan kaçınılması tavsiye edilir.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ

FLUMYZIN 50 WG uygulanmış tarla, herhangi bir nedenden dolayı bozulursa, bozulan tarlaya buğday, soya, pamuk, mısır, fasulye, ayçiçeği ve sorgum bitkileri 30-45 gün sonra ekilebilir (10 cm kadar hafif sürümden sonra). Diğer münavebe ürünleri için firmanıza danışınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

FLUMYZIN 50 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup E;14 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için FLUMYZIN 50 WG' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup E;14 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Uygulama zamanında herhangi bir karışıma ihtiyaç yoktur. ✓



SUMİTOMO CHEMICAL

Sumitomo Chemical Turkey Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

FLUMYZIN 50 WG

Grubu	E;14	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	------	-----------------------------

%50 Flumioxazin

- Önce etiketli okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki Koruma Ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki Koruma Ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerindeki riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

RUHSAT SAHİBİ

Sumitomo Chemical Turkey Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Barbaros Mah. Çiğdem Sokak No: 1, Ağaoğlu My Office Kat :10 No: 44-45
34746 Ataşehir, İstanbul / Türkiye
Tel : +90 216 680 33 34 - Fax : +90 216 680 10 12

ÜRETİCİ FIRMA

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S
10 A rue de la Voie Lactée, Parc d'affaires de Crécy
69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lyon/ Fransa

ÜRETİM YERİ

SCHIRM GmbH, Mecklenburger Strasse 229-D-23568
Lübeck - Almanya

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

18 Temmuz 2025



Yusuf DEMİR
Geliştirme & Ruhsatlandırma Müdürü
Sumitomo Chemical Turkey
Kimya San. ve Tic. A.Ş.