

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Ruhsat Tarih ve Numarası:
Net Miktarı:

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Elma	Elma İçkurdu (<i>Cydia Pomonella</i>)	8 adet feromon yayıcı çubuk/da (kenar ve tampon uygulamaları hariç)
Ayva	Elma İçkurdu (<i>Cydia Pomonella</i>)	8 adet feromon yayıcı çubuk/da (kenar ve tampon uygulamaları hariç)
Armut	Elma İçkurdu (<i>Cydia Pomonella</i>)	8 adet feromon yayıcı çubuk/da (kenar ve tampon uygulamaları hariç)

ENTERUPT MD CMDA COMBO MESO-A, polimerik matris teknolojisi ile geliştirilmiş, çiftleşmeyi engelleyici feromon içeren bir dağıtıcı sistemdir. Elma içkurdu (*Cydia pomonella*) erginlerinin arasındaki çiftleşme iletişimini bozar. Bu etki şekliyle döl sayısında ve zararlı popülasyonunun gelişme oranında azalmaya neden olmaktadır.

MONİTÖR TUZAKLARIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Elma içkurdu popülasyonunun izlenmesi için eşeysel çekici tuzaklar 1 Ocak' tan itibaren etkili sıcaklıklar toplamı 40-80 gün-derece civarına ulaştığında (mart sonu-nisan başı) çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra bahçenin ortalarında bulunan elma ağacının tacının dış kısmına ve yerden 1.5-2 m yükseğe ve hakim rüzgar yönünde 5 hektara 1 adet gelecek şekilde asılır. Tuzaklardaki feromon kapsülleri 4-5 haftada bir, yapışkan tablalar ise gerektiğinde değiştirilir. Tuzaklar ilk ergin yakalanıncaya kadar haftada 2-3 kez kontrol edilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Eşeysel çekici tuzaklarda ilk erginin yakalanmasıyla birlikte, ENTERUPT MD CMDA COMBO MESO-A Elma içkurdu feromonu içeren yayıcılar, elma bahçesine 8 adet/da dozunda bahçeye homojen şekilde ve ağaç yüksekliğinin 1/5'lik en üst kısmındaki yan dallara asılır. Uygulama alanına 80-100 m den daha yakın bir ilaçlı elma bahçesi varsa, buradan çiftleşmiş dişi bireylerin göçünü engellemek yani izolasyonu sağlamak gerekir. Bu amaçla, ENTERUPT MD CMDA COMBO MESO-A uygulanan elma bahçesine sınır olan bahçelere de 30 metre içeriye girilerek tampon bölge oluşturulmalıdır. Oluşturulan bu tampon bölgede de tavsiye edilen aynı yayıcı yoğunluğu kullanılır. ENTERUPT MD CMDA COMBO MESO-A hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

ÖNLEMLER:

Küçük elma alanlarında da bu teknik ile iyi bir kontrol sağlanır ancak başka bahçelere bitişik olan küçük elma alanlarında uygulanmamalıdır. Orta ve büyük ölçekli (20-40 dekaradan büyük) elma bahçelerinde, ilk uygulama yıllarında ve yüksek popülasyon koşullarında uygun bir insektisit ile karma strateji izlenebilir. Insektisit kullanımı yayıcıların çalışmasına zarar vermez, dolayısı ile her an müdahale edilebilir.

GLYRON

ENTERUPT MD CMDA COMBO MESO-A

Grubu	-	Feromon
-------	---	---------

850mg 8,10-Dodecadien-1-ol, (8E,10E)+ 500mg 2,4-decadienoic acid, ethyl ester (E,Z) *feromon yayıcı*

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Sıcak ve ateşten uzak tutunuz.
- Deri ve göz temasından kaçınınız
- Solumayınız, sigara içmeyiniz.
- Uygulama sırasında eldiven kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Feromonun göze ve cilde teması durumunda tahriş edici olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın. Solunum semptomları görülmesi halinde, Bir zehir merkezini veya doktoru arayın.

Deriyle temas etmesi halinde; Cildi bol su ile yıkayın. Ciltte tahriş söz konusu ise, Tıbbi yardım/müdahale alın.

Gözle temas etmesi halinde; Gözleri tedbir amaçlı suyla yıkayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Göz tahrişi kalıcı ise, Tıbbi yardım/bakım alın.

Yutulması halinde; Ağızı çalkalayın. Kusmaya zorlamayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidodu yoktur. Belirtilere göre tedavi edilir.

ZEHİRLENME DURUMUNDA ULUSAL ZEHİR-
DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)' NİN 114 NUMARALI
TELEFONUNU ARAYINIZ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Bayram KERİMOĞLU
Daire Başkanı V.

20 Haziran 2025

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER

8,10-Dodecadien-1-ol, (8E,10E) + 2,4-decadienoic acid, ethyl ester

ÖNLEM İFADELERİ:

P280 Koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/maske kullanın.
P501 Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz..

EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Etikette önerilen şekilde kullanınız
Feromon yayıcı yerleştirileceği anda orijinal ambalajından çıkarılmalı, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Kullanımdan sonra elleri yıkayınız
Boş ambalajları ve kapsülleri atarak kirletmeyiniz
Feromonu serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
Aluminyum folyeyi açmayınız.
Feromonu orijinal ambalajında ağız kapalı olarak saklayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Orijinal ambalajında ve 4°C altındaki depolama şartlarında ürün 2 yıl depolanabilir ve etkinliğini korur.

FİRMA BEYANI

Bitki Koruma Ürünü çok farklı koşullarda denenmiş olmasına rağmen kontrolümüz dışındaki faktörlerden doğabilecek olası etkilerden sorumlu değildir. Firmamız ürünün kompozisyonu, formülasyonu ve içeriğini garanti eder. Hatalı kullanımlardan doğabilecek herhangi bir zararlanmada ürünün kullanıcı sorumludur. Uygulamalardan etkin bir sonuç almak ve kültür bitkisine, insan ve hayvanlara herhangi bir zarardan kaçınmak için kullanıcılar yukarıda sözü edilen talimatlara mutlaka uymalıdır.

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ: Trécé Inc.

7569 Highway 28 West Adair, OK 74330-2817 ABD

RUHSAT SAHİBİ FİRMA: Glyron kimyevi maddeler San. Tic. LTD STİ.

Atasehir mah. 8261 Sokak Bertur.Konut.Yapı; C Blok 14/2
Çiğli -İzmir, Türkiye
Tel: +90 232 3761828
Fax: +90 232 3761828

© ENTERUPT CMDA COMBO MESO-A, Trécé firmasının tescilli ticari markasıdır

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Ruhsat Tarih ve Numarası:
Net Miktarı:

Feromon havadan ağır olup yere doğru inmeye meyillidir, sarp veya büyük anayollara yakın olan arazilerde konsantrasyonu korumak güçtür. Bu durumda, sınırlara emniyet şeritlerinin yerleştirilmesi gerekir. Sınırlarda 80-100 metreden yakında Elma içkurdu'nun konukçusu olduğu başka bir meyve bahçesi varsa 30 metre içeriye girilerek tampon uygulaması yapılır. Normal hava koşullarında, dağıtıcının tarla ömrü yaklaşık 180 gündür, ancak çok yüksek ısı, şiddetli ve uzun süreli rüzgarlar yayıcının ömrünü kısaltabilir, dozun artırılması veya karma stratejiler uygulanması gerekir.

KONTROLLER:

Feromon uygulanan elma bahçeleri izleme tuzaklarının yardımıyla sezon boyunca yayılan feromon konsantrasyonunun yeterli olup olmadığını saptamak amacıyla belli sürelerle (her hafta) takip edin. Belli sürelerle (elma içkurdu riskine göre 1-2 haftada bir) merkez ile kenar arasındaki ağaçlarda meyveleri kontrol edin. Yapılan kontrollerde %5'ten fazla Elma içkurdu saptanırsa ilaçla müdahale edilerek karma bir strateji izlenmelidir. Özellikle ilk kez yayıcı feromon uygulanan bahçelerde genellikle ilk döllerde ilaç müdahale gerekebilir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

20 Haziran 2025

ss
h



ENTERUPT MD CMDA COMBO MESO-A

Grubu	-	Feromon
-------	---	---------

850mg 8,10-Dodecadien-1-ol, (8E,10E)+ 500mg 2,4-decadienoic acid, ethyl ester (E,Z) / *Feromon yayıcı*

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi edilir.

ZEHİRLENME DURUMUNDA ULUSAL ZEHİR
DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NUMARALI
TELEFONUNU ARAYINIZ.



Gürler TAN
Genel Müdür

GLYRON
KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ATAŞEHİR MH. 8261 SK. BERTUR KONUT YAPİ
C BLOK NO: 14 16-KA1 NO: 2 ÇİĞLİ / İZMİR
V.D.: HASAN TAHSİN - V.N.: 396 103 3589