

İmal Tarihi:

Son kullanma tarihi:

Sarı numarası:

Ruhsat tarihi ve numarası:

02-09-2026/14165

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Pamuk	Yesilkurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	17,5 ml/da	21 gün
	Pamuk yaprakkurdu ( <i>Spodoptera litoralis</i> )	17,5 ml/da	21 gün
Elma-Armut	Dikenlikurt ( <i>Earis insulana</i> )	20 ml/da	21 gün
	Armut yaprak galteri güvesi ( <i>Leucopiera scitella</i> )	17,5 ml/100 l su	14 gün
Ayva	Elma içkürdü ( <i>Cydia pomonella</i> )	12,5 ml/100 l su (yumurta)	14 gün
	Elma içkürdü ( <i>Cydia pomonella</i> )	12,5 ml/100 l su (yumurta)	14 gün
Şeftali, Kayısı	Şeftali güvesi ( <i>Amarisia linearis</i> )	20 ml/100 l su	14 gün
	Doğu Meyve güvesi ( <i>Cydia molesta</i> )	17,5 ml/100 l su	14 gün
Nektarin	Şeftali güvesi ( <i>Amarisia linearis</i> )	20 ml/100 l su	14 gün
	Doğu Meyve güvesi ( <i>Cydia molesta</i> )	17,5 ml/100 l su	14 gün
Erik	Şeftali güvesi ( <i>Amarisia linearis</i> )	20 ml/100 l su	14 gün
	Patates Böceği ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )	6 ml /da (harva)	14 gün
Patates	Mısır Kocankurdu ( <i>Sesamia spp.</i> )	15 ml/da (15 gün ara ile 2-3 uygulamalı)	14 gün
	Mısırkurdu ( <i>Ostrinia nubilalis</i> )	15 ml/da (15 gün ara ile 2-3 uygulamalı)	14 gün
Mısır	Bozkurt ( <i>Agravis ipsilon</i> , <i>Agravis segetum</i> )	15 ml/da	14 gün
	Salkım güvesi ( <i>Lobesia botrana</i> )	15 ml/100 l su (yumurta)	3 gün sofralık, 28 gün şaraplık, 7 gün asma yaprağı

Devamı 2. Sayfada

Ş.Ş.

Ş

AMC-TR TARIM SANAYİ ve TİC. A.Ş.



AMC-TR

## LABOUR 200 SC

Süspansiyon Konsantré (SC)

GRUBU 28 İnsektisit (Böcek İlacı)

200 g / l Chlorantraniliprole

- Önce etiketi okuyunuz.
  - Evde kullanmayınız.
  - Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
  - Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
  - Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
  - İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambajlarının içine ¼ üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ULUSAL ZEHİR DANİŞMA MERKEZİ RÜZEMELERİ: 114

02 Temmuz 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KONTROL EDİLMİŞTİR



Net miktarı :  
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER  
Chlorantraniliprole

ZARARLILIK İŞARETİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.  
H361: Doğranmış çocukta hasara yol açma şüphesi var.  
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.  
P273: Çevreye verilmesinden kaçınm.  
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanın.  
P391: Döküntüleri toplayın.  
P501: İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.  
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

Burhan ŞİMŞEK  
Ziraat Yüksek Mühendisi

AMC-TR TARIM  
SANAYİ VE TİC. A.Ş.  
Çarşamba, 1. Baharlar Ekiyeti  
Sic. No: 2024/115 Fesce/023/1354  
Tel: 0 262 24 4115 Faks: 0 262 24 1354  
E-Posta: AR.V.D. 781 019 0156

2.sayfa  
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdaysen ilaç su deposu ilave edilir. Karışımaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlandıktan sonra kademli karışımaya işlemine devam edilir. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılır.

**KALIBRASYON:** İlaçlama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaç su miktarı ayarlanmalıdır. İlaçlamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:** İlaçlamamın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**Bağda, Salkım güvesi** ovisit (yumurta) uygulaması için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı henüz tepе noktaya ulaşmayıp, yükselmenin devam etmesi, etkili sıcak toplanımın **1. döde** en geç 95-100 gün dereceye ulaşması, salkım fenolojisinin çiçek tomurcuğu döneminde olması; henüz yumurta bırakılmadan **2. döde** eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayılarında göre çizilen uçuş eğrisinde tepе noktasının oluşmayıp yükselmenin devam etmesi, etkili sıcaklık toplanımın 450-460 gün dereceye ulaşması, salkım fenolojisinin korunak döneminde olması ve henüz yumurtaların bırakılmaması olması; **3. döde** eşeysel çekici tuzaklarda ilk kelebeklerin yakalanmaya başlaması, etkili sıcaklık toplanımının 970-980 gün dereceye ulaşması, salkımlarda tanelerin tatlannmaya başlaması, tüm bu koşulların sağlanması sonucu yapılan sayımlarda henüz yumurta bırakılmadan ilaçlama yapılır.

**Elma, Armut ve Ayyada, elma iç kurduna** karşı ilaçlamaların tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır. **Labour 200 SC** ile bu zararı müdahalesinde en iyi etkili ilaçlamamı, yumurtlama döneminde yumurtalar açılmadan larvaların meyveye girişinden önce yapılması gerekir. İlaçlama zamanının saplanması için ağacın fenolojisi ve zararının biyolojisi (kelebek uçuşları) takip edilmeli, yayıncı kuruluştardan da bilgi alınmalıdır.

**Elma ve Armutta yaprak galeri güvesine** karşı: Meyve bahçesi ve fidanlarda, nisan ayı ortalarından itibaren ilk çıkan yapraklar kontrol edilir. Her ağaçtan 20 adet oluk üzere en az 5 ağaçtan yaprak alınıp canlı larvalar sayılmalıdır. Yaprak başına ortalama 4 veya daha fazla canlı larva varsa ve parazitlenme oranı da çok düşük ise, ilaçlama yapılır.

Devamı 3. Sayfada

AMC-TR TARIM SANAYİ ve TİC. A.Ş.



AMC-TR

## LABOUR 200 SC

Suspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU 28 İnsektisit (Böcek İlacı)

200 g / l Chlorantraniliprole

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Acil durum numarasını, zehir kontrol merkezini veya hekimini arayın ya da tedaviye giderken ürün kabını, etiketi veya Güvenlik Bilgi Formunu yanınıza alın.

### ILKYARDIM ÖNLEMLERİ:

**Solunma:** Temiz havaya çıkarm. Kazazedeyi sıcağın tutun ve dinlendirin. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapın. Bir doktor çağırın.

**Yutma:** Ağzı çalkalayın. Bilinci yerinde olmayan veya kafası karışmış kişileri asla kusturmaya çalışmayın. Tıbbi yardım alın.

**Ciltle Temas:** Kirlili tüm giysilerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarm ve hemen bol su ve sabunla yıkayın. Kirli giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın. Gerekirse bir doktora danışın.

**Gözlerle Temas:** Derhal göz kapaklarını alı dahil olmak üzere en az 15 dakika bol su ile yıkayınız. Kontakt lensleri çıkarm. Acil tıbbi yardım gereklidir.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:** Özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

02 Ocak 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KONTROL EDİLMİŞTİR



**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

-Arılara zehirlidir, ürünün çiçeklenme zamanı ilaçlama yapmayınız.  
-İlaçlamalar bal arılarının aktif olmadığı dönemde yapılmalıdır.  
-Balkılar için zehirlidir. Yer altı ve yer üst buluşmaktan sakınınız.  
-İpek böceklerine etkili olduğu için ilaçlama anında ilacın rüzgarla yakındaki dut ağaçlarına taşınmasına engel olunuz.

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zarurlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

Burhan ŞİMŞEK

Ziraat Yüksek Mühendisi





4 sayfa

**Mısırda Bozkurt (Agrotis ipsilon, Agrotis segetum) zararlısı ile mücadelede zararlının bulunması muhtemel olan ya da sıraya ekim yapılan yerlerde, 10 ayır yerde 3'er metrelik sıralar üzerinde en az 2 yeni bitkinin bulunduğu tarhalarda ilaçlama yapılmalıdır.**

Mısrda sezon içinde aynı yerde 2'den fazla **Labour 200 SC** uygulaması yapılmaz.

**Patatesle Patates Böceğine karşı** günlük ortalama sıcaklık 14-15 °C'ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametine girilerek, ocaqlarda zararının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir döneme rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaktır. İkinci döle uygun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebilirliğinden uygulama gerekmezdir.

**LABOUR 200 SC hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.**

#### **DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

**Labour 200 SC** isimli Bitki Koruma Ürünü, etki mekanizmasına göre GRUP 28 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip Bitki Koruma Ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **Labour 200 SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplan uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (GRUP 28 hariç) Bitki Koruma Ürünlerinin kullanımına özen gösteriniz.

#### **KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:**

Diğer Bitki Koruma Ürünleri ile karıştırılmaz

**AMC-TR TARIM SANAYİ ve TİC. A.Ş.**



**AMC-TR**

**LABOUR 200 SC**

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU

28

Insektisit (Böcek İlacı)

200 g / l Chlorantraniliprole

ULUSAL ZEHİR DANISMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

02 Temmuz 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KONTROL EDİLMİŞTİR



**Burhan ŞİMŞEK**  
Ziraat Yüksek Mühendisi

**AMC-TR TARIM**  
SANAYİ ve TİC. A.Ş.  
Genel Müdürlük Bülteni  
Sırtak Sokakı No: 41/2 ANKARA  
Tel: 0312 331 15 Faks: 0312 331 15 26  
E-Posta: info@amctr.com.tr

Ş.K