

Emendo®

**ÜSTÜN ETKİLİ
YENİ NESİL
MİLDİYÖ İLACINIZ**



www.amc-tr.com



AMC - TR

E-mendo®

KULLANILDIĐI BİTKİLER ve DOZLARI

BİTKİ	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMAYLA HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Bağ	Bağ Mildiyösu (<i>Plasmopora viticola</i>)	250 g/100 L su	28 gün
Domates (Tarla)	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	250 g/dekar	3 gün
Patates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	250 g/dekar	7 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ Mildiyösu: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. İlacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Domates Mildiyösu: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Patates Mildiyösu: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

Çağlayan Mah. Barınaklar Bulvarı Sıdıka Polat Apt. No:41/2 Antalya - TÜRKİYE

Tel: 0 242 324 13 15 - Fax: 0 242 324 19 69

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA HATTI: 114

www.amc-tr.com



AMC-TR