

İmal Tarih: Son Kullanma Tarihi: Şarj No: Ruhsat Tarih ve No.su: 01.06.2021/11931

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Kullanım dozu ve dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Hububat	Süne (<i>Eurygaster spp.</i>)	15 ml / da 1-3. dönem ve 4-5. dönem nimf ve yeni nesil ergin	14 gün
	Kırmı (<i>Aelia rostrata</i>)	45 ml / da Kışlanmış ergin, 2-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin	14 gün
	Hububat hortumlu böceği (<i>Pachytychius hordei</i>)	15 ml / da	14 gün
Mısır	Mısır kurdu (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	40 ml / da 15 gün ara ile 3 ilaçlama (Yumurta ilk tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır.)	14 gün
	Mısır koçankurdu (<i>Sesamia spp.</i>)		14 gün
Domates	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	50 ml / da	14 gün
Zeytin	Zeytin sineği (<i>Bactrocera oleae</i>)	25 ml / 100 lt su	14 gün
	Zeytin karakoşnili (<i>Saissetia oleae</i>)	50 ml/100 lt su	14 gün
Elma	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	20 ml /100 lt su	14 gün
	Elma ağkurdu (<i>Yponomeuta malinellus</i>)	15 ml /100 lt su	14 gün
Fındık	Fındık kurdu (<i>Curculio nucum</i>)	40 ml / da	14 gün
Bağ*	Bağ maymuncukları (<i>Otiorynchus spp.</i>)	30 ml /100 lt su	7 gün
Pamuk**	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	200 ml / da larva	14 gün
Şeker pancarı	Kalkan böcekleri (<i>Cassida spp.</i>)	20 ml / da	14 gün
	Pancar piresi (<i>Chaetocnema tibialis</i>)	15-20 ml / da	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz

**Akdeniz bölgesinde kullanılmaz

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.

SCHELKOVO AGROCHIM TURKEY TARIM LTD.ŞTİ.

ACBARCE EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	3 A	İnsektisit (Böcek İlacı)
-------	-----	--------------------------

100 g/l Alpha-cypermethrin

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SİRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Hareketlerde dengesizlik, deride uyuşma, yanma gibi belirtiler görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Solunması halinde: Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın.

Deriyle temas etmesi halinde: Cildi su ve sabun ile iyice yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın. Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.

Gözle temas etmesi halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Derhal bir doktor çağırın.

Yutulması halinde: Hemen zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.

25 Şubat 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net miktar:

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER

Alpha-cypermethrin

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302+H312 Yutulması halinde veya ciltle teması halinde zararlıdır.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332 Solunması halinde zehirlidir.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlara zarar verebilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P260 Dumanını, buharını solumayın.

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P301+P312 Yutulduğunda: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR BİLGİ MERKEZİ arayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/koruyucu gözlük/maske kullanın.

P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.

EUH 401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

-Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.

-Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.

-İlaçlı mahlülün tamamını tarlaya püskürtünüz.

-Boşalan ambalajları başka maksatlar için kullanmayınız.

SCHELKOVO AGROCHIM TURKEY
TARIM LİMİTED ŞİRKETİ
Cihangir Mah. Cıva Cad.
No:20/A Avcılar / İSTANBUL
Avcılar V. D. : 757 047 61 83

Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Süne: Zararlı tarlaya indikten sonra sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Süne mücadelesinde esas, 1.-3. dönem nimflere karşı yapılacak kimyasal mücadeledir. m² 'de 10 nimf ve üzerinde yoğunluk tespit edildiğinde mücadeleye başlanır. 2. dönem nimfler görüldüğünde başlanması 4. dönem nimfler görülünceye kadar devam edilmesi mücadele zamanı yönünden temel kriterdir. Bu süre yaklaşık 15 gündür. Belirlenen süre içerisinde mücadele bitirilemediği durumda 4.-5. nimf dönemlerinde ve yeni nesil erginlere karşı da mücadeleye devam edilebilir.

Kıvılcık: Mücadele esas olarak kıvılcık erginlere karşı yapılır. Kıvılcık erginlere karşı yapılmadığı durumlarda, m² 'de ortalama 10 adet 2.-5. dönem nimf veya yeni nesil ergin bulunan alanlarda hemen ilaçlama yapılmalıdır.

Hububat hortumlu böceği: Mücadele zamanının tespiti için erginlerin topraktan ilk çıkışı ve hububat fenolojisi izlenmelidir. Toprakta kademeli olarak çıkan bu zararlıya karşı, çıkıştan yaklaşık 10 gün sonra (sapa kalkma dönemi) ilaçlamaya başlanmalıdır. m² 'de ortalama 5 veya daha fazla ergin böcek saptanan alanlarda ilaçlama yapılmalıdır.

Mısır kurdu ve mısır koçan kurdu: Bulaşık bitki sayısı %5 ve üzerinde olması durumunda ilaçlama yapılır. Bitki boyu 40-50 cm'ye ulaştığında, ilk yumurtaların tespiti ile ilaçlamaya başlanmalı ve 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılmalıdır.

Domateste yeşilkurt: Bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünleri kontrol edilerek 100 bitkiden 5'inde yumurta ve larva bulunursa ilaçlamaya başlanır.

SCHELKOVO AGROCHIM TURKEY TARIM LTD.ŞTİ.

ACBARCE EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	3 A	İnsektisit (Böcek İlacı)
-------	-----	--------------------------

100 g/l Alpha-cypermethrin

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL:114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ:

JSC SCHELKOVO AGROHIM
Zavodskaya Str. 2, Schelkovo, Moscow region, 141108,
Russian Federation

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SCHELKOVO AGROCHIM TURKEY TARIM LTD.ŞTİ.
Cihangir Mahallesi Civa Caddesi No:20/A
Avcılar-İSTANBUL
Tel&Fax: 0 212 590 11 91

SCHELKOVO AGROCHIM TURKEY
TARIM LIMITED ŞİRKETİ
Cihangir Mah. Civa Cad.
No:20/A Avcılar / İSTANBUL
Avcılar V. D. : 757 047 61 83

25 Subat 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



f
1

Zeytin sineği: Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde, salamuralık çeşitlerde %1 vuruk, yağlık çeşitlerde %6-8 vuruk saptandığında ilaçlama yapılmalıdır.

Zeytin karakoşnili: Yumurtaların % 50'sinin açıldığı dönemde birinci, %90'nının açıldığı dönemde ise ikinci uygulama yapılır.

Elma içkurdu: Elma içkurdu'na karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her dölle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma ağ kurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Fındık kurdu: Bahçedeki hakim çeşitlerin yarısından fazlası mercimek iriliğine yaklaşıncaya (3-4 mm) ilaçlama yapılmalıdır. Popülasyonun yüksek olduğu yerlerde, yumurta koyarak yaptığı zararı engellemek için Mayıs-Haziran aylarında ikinci bir ilaçlama yapılmalıdır.

Bağ maymuncuğu: Erken ilkbaharda, toplam 25 asmanın 10'unda zararlı veya zararı saptanırsa ilaçlama yapılmalıdır.

Pamukta yeşilkurt: Rastgele seçilen 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda ilaçlamaya başlanır. En iyi etkiyi elde etmek için her dölde yumurtadan yeni çıkmış larvaların çoğunlukta olduğu dönem iyi belirlenmelidir. İlaçlama sabah erken saatlerde veya akşam geç saatlerde yapılmalıdır.

Şeker pancarında kalkan böcekleri: Nisan ayı ortasından itibaren bitki yaprakları kontrol edilir. Ergin ve/veya larvalar görüldüğü zaman ilaçlama yapılmalıdır.

Şeker pancarında yaprak pireleri: Bitki başına en az 5 ergin görüldüğü zaman ilaçlama yapılmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

Acbarce EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3 A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için

Acbarce EC' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3 A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Difer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

SCHELKOVO AGROCHIM TURKEY TARIM LTD.ŞTİ.

ACBARCE EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	3 A	Insektisit (Böcek ilacı)
-------	-----	--------------------------

100 g/l Alpha-cypermethrin

SCHELKOVO AGROCHIM TURKEY
TARIM LIMITED ŞİRKETİ
Cihangir Mah. Civa Cad.
No:20/A Avcılar / İSTANBUL
Avcılar V. D. 757 047 61 83

25 Şubat 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

