

İmal Tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj numarası:
Ruhsat tarihi ve numarası:

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR :

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Tütün Beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	40 g/da (larva, ergin)	-
Pamuk	Yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	10 g/da (nimf, ergin)	-
Pamuk	Yaprakpireleri (<i>Asymmetrasca decedens</i> , <i>Empoasca decipiens</i>)	10 g/da (nimf, ergin)	-
Tütün	Şeftali Yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	10 g/da (nimf, ergin)	10 gün
Patates	Patates Böceği (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	6 g/da (larva, ergin)	7 gün
Elma	Elma Yeşil Yaprakbiti (<i>Aphis pomi</i>)	20g/100L su (ergin, nimf)	14 gün
Antepfıstığı	Antepfıstığı Psillidi (<i>Agonoscena pistaciae</i>)	20g/100L su (ergin, nimf)	7 gün
Karpuz	Şeftali Yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	25g/da (ergin, nimf)	7 gün
Kiraz	Kiraz Siyah Yaprakbiti (<i>Myzus cerasi</i>)	25 g/100L su (nimf, ergin)	7 gün

AMC-TR TARIM SAN. ve TİC. A.Ş



AFFIX 20 SP

Suda Çözünen Toz (SP)

GRUP	4A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	----	-----------------------------

%20 Acetamiprid

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulaması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve/veya hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Yutulması halinde: Mide bulantısı, kusma.
Ciltle teması halinde: Ciltte tahriş, kızamıklık.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Solunum:

Kazazedeyi temiz havaya çıkarın. Solunumun düzensiz olması veya durması durumunda suni solunum uygulayın. Hastayı sıcak tutun ve dinlendirin. Hemen bir doktora başvurun.

Yutma:

Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN.

Net miktarı :

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER

Acetamiprid, Sodyum dodesil sülfat

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Korumacı kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.

P301+P312: YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE:Tıbbi yardım/bakım alın.

P501: İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- İlacı serin, kuru ve iyi havalanabilen yerlerde muhafaza ediniz.
- Kullanılmış boş ambalajları başka bir amaç için kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boş kapları usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

Burhan ŞİMŞEK

Ziraat Yüksek Mühendisi

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

23 Subat 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**AMC-TR TARIM
SANAYİ ve TİC. A.Ş.**

Çağlayan Mah. Bahçelılar Bulvarı
Sıdika Evi No: 41/2 ANTALYA
Tic. Sic. No: 272200
Vergi No: 0247 324 19 60

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesini deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesini deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta pamuk yaprakbitine karşı: Fide döneminde seyreltmeden sonra yaklaşık %50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Pamuk yaprakpirelerine karşı; Surveyde 50 da'lık pamuk tarlası 4 bölüme ayrılır. Her bölümden rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısımdan alınan 1'er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alanda toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı tespit edilir. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Pamukta tütün beyazsineğine karşı: Beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Tütünde şeftali yaprakbitine karşı: Bir yaprakta ortalama 25 adet nimf+ergin görüldüğünde uygulamaya geçilmelidir. Fide döneminde zararlı görülünce uygulama yapılır.

AMC-TR TARIM SAN. ve TİC. A.Ş



AFFIX 20 SP

Suda Çözünen Toz (SP)

GRUP	4A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
------	----	-----------------------------

%20 Acetamiprid

Ciltle temas:

Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın. Hemen bol su ile yıkayınız. Cilt tahrişi devam ederse doktora başvurunuz. Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

Gözlerle temas:

Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak üzere 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Kontakt lensleri çıkarın. Acil tıbbi yardım gereklidir.

Antidotu ve Tedavisi:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde oluşabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA:

SHANDONG SINO-AGRI UNITED BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

No.28, Sangyuan Road, Jinan City, Shandong 250100

P.R. ÇİN

Üretim Tesis:

Shandong United Pesticide Industry Co., Ltd.

Building 1#, Middle Shengli Road, Daxin Village, Fan Town,

Daiyue District, Taian City, Shandong, ÇİN

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AMC-TR TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.

Çağlayan Mah. Barınaklar Bulvarı

Sıdika Polat Apt. No: 41/2 ANTALYA – TÜRKİYE

Tel: 0 242 324 13 15 - Faks: 0 242 324 19 69

www.amc-tr.com

Burhan ŞİMŞEK
Ziraat Yüksek Mühendisi

AMC-TR TARIM
SAN. VE TİC. A.Ş.
Çağlayan Mah. Barınaklar Bulvarı
Sıdika Polat Apt. No: 41/2 ANTALYA
Tel: 0 242 324 13 15 - Faks: 0 242 324 19 69
KURUMLAR V.D.: 781 019 6358



23 Subat 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Patateste patates böceğine karşı : Günlük ortalama sıcaklık 14-15 °C'ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci dölle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci dölle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40'a kadar çıkmaktadır.

Antepfistığında antepfistığı psillidine karşı: Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında, ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Elmada yeşil yaprakbiti: Vejetasyon süresi boyunca 100 sürgünden 15'inde bulaşıklık olursa uygulama yapılmalıdır.

Karpuzda, şeftali yaprakbitine karşı : Tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. Karpuz gibi büyük yapraklı bitkilerde bir yaprağa düşen yaprakbiti sayısı 10-20 adet ise uygulamaya başlamak gerekir.

Kirazda siyah yaprakbiti: Mart- ekim ayları arasında bir ağaçta 7 adet bulaşık dal bulunduğunda uygulama yapılmalıdır.

AFFIX 20 SP hakkında bir şikâyetiniz olması halinde il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ :

AFFIX 20 SP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için AFFIX 20 SP' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :

Difer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

AMC-TR TARIM SAN. ve TİC. A.Ş.



AFFIX 20 SP

Suda Çözünen Toz (SP)

GRUP	4A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	----	-----------------------------

%20 Acetamiprid

Burhan ŞİMŞEK

Ziraat Yüksek Mühendisi

AMC-TR TARIM


SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Çeşme Yayı Mh. Barınaklar Bulvarı

Sıdya Pataş No: 41/2 ANTALYA

Tel: 0 242 324 19 15 Faks: 0 242 324 19 69

TELEFONLAR V.D.: 781 019 6358



23 Şubat 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.