

İmal Tarihi :
Son kullanma tarihi :
Ruhsat tarih ve No'su : 27.05.1998-3422/98-102
Şarj No :

KULLANILACAK İTİKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Elma	Avrupa kırmızı örümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	25 ml/100 l su (Yumurta, larva, nimf)	14 gün
Domates	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	35 ml/100 l su (Larva, nimf)	3 gün
Pamuk	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/da (Yumurta, larva, nimf)	21 gün
Pamuk	Kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml/da (Yumurta, larva, nimf)	21 gün
Karpuz	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/da (Larva, nimf)	3 gün
Turunçgil *	Turunçgil kırmızı örümceği (<i>Panonychus citri</i>)	25 ml/100 l su (Yumurta, larva, nimf)	21 gün
Bağ **	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 l su (Yumurta, larva, nimf)	7 gün
Biber (Sera)	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	35 ml/100 l su (Larva, nimf)	3 gün
Çilek (Tarla)	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	35 ml/100 l su (Larva, nimf)	1 gün
Hiyar (Tarla ve Sera)	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	35 ml/100 l su (Larva, nimf)	3 gün
Mısır	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/da (Yumurta, larva, nimf)	1 gün
Şeftali Nektarin	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 l su (Yumurta, larva, nimf)	3 gün
Patlıcan (sera)	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	35 ml/100 l su (larva, nimf, ergin)	3 gün

* Turunçgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.

** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.



Sumitomo Chemical Turkey Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ZOOM 10 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	10B	Akarisit (Kırmızı Örümcek İlacı)
-------	-----	----------------------------------

110 g/L Etoxazole

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki Koruma Ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki Koruma Ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerindeki riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan Bitki Koruma Ürününün boş ambalajının ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHRİLENME BELİRTİLERİ

Adımlarda duzensizlik, kol ve bacaklarda paraliz, duzensiz nefes alma, gözlerden yaş akması, idrar kaçırma, ishal gözlemlenmiştir. (Bu gözlemler 3500 mg/kg' dan yüksek doz verilen sıçanlarda saptanmıştır.)

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Doktora Erişim

14 Temmuz 2006

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL ÇİZGİSİ

Net Miktarı : ... L
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER
Etoxazole

ZARARLI İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLI İFADELERİ

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNEMLİ İFADELERİ

P203 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P272 Çevreye verilmemesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P391 Döküntüleri toplayın.

P501 Kabi uygun bir şekilde bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Sulara buluşturmayınız.
- Bitki koruma ürününü serin, kuru ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
- Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- Boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

SUMITOMO CHEMICAL TURKEY
Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Barbaros Mah. Çiğdem Sk. No:1 Ağaçoğlu My Office
Kat:10 D:44-45 34746 Ataşehir - İstanbul
Koruyucu V.D. 782 066 9584 Tic.Sic. No: 09059

Yusuf DEMİR

Geliştirme & Ruhsatlandırma Müdürlüğü
Sumitomo Chemical Turkey
Kimya San. ve Tic. A.Ş.

SUMITOMO CHEMICAL

Sumitomo Chemical Turkey Kimya
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ZOOM 10 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	10B	Akarisit (Kırmızı Örmcek İlaç)
-------	-----	-----------------------------------

110 g/L Etoxazole

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdaki ilaç su deposuna ilave edilir. Karıştırma devam edilecek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN VE EKİPMANININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Özellikleri: Kontak etkili akaristtir. Kırmızı örmceklerin yumurta, larva ve nimflerine karşı dönem değiştirmelerini engellemek suretiyle etki gösterir. Erginlere etkili değildir. Bununla birlikte uygulamadan 3-5 gün sonra belirlen etkisini gösterir ve etki devamlılığı bir ay civarındadır.

Elma Avrupa kırmızı örmceği: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates, hıyar, patlıcan ve biber kırmızı örmcekler: Domates, hıyar ve patlıcanda yaprak başına ortalama 5 adet, biberde 3 adet canlı kırmızı örmcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Pamukta kırmızı örmcekler: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunursa sadece bu kısımlar uygulanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesinde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 10 adet canlı kırmızı örmcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Karpuz iki noktalı kırmızı örmcek: Sebze bahçelerinde ilk sayım için çiçeklenme döneminde araziye parsellerin köşegenlerinden çapraz olarak girilir. 3-5 adımda bir, bitkinin dip ve orta yapraklarında kırmızı örmcek nimf ve erginlerinin sayımı yapılır. Yapraklar üzerindeki canlı kırmızı örmcekler büyüteç ile sayılıp kayıtlı edilir. Toplam kırmızı örmcek sayısı yaprak adetine bölünür. Bir yaprağa düşen canlı kırmızı örmcek sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızı örmcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.

FİRMA BEYANI

Firmamız, orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı doğacak sorunlardan mesuliyet kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Sumitomo Chemical Turkey Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Barbaros Mah. Çiğdem Sokak No: 1
Ağaoğlu My Office Kat :10 No: 44-45
34746 Batı Ataşehir, İstanbul / Türkiye
Tel : +90 216 680 33 34 - Fax : +90 216 680 10 12

ÜRETİCİ FİRMA

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S
10A rue de la Voie Lactée, Parc d'affaires de Crécy
69370 Saint Didier au Mont d'Or - Lyon/ Fransa

ÜRETİM TESİSİ

SBM-Formulation, CS 621 - ZI, avenue Jean Foucault,
34535 Béziers Cedex - Fransa

SUMITOMO CHEMICAL TURKEY Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Barbaros Mah. Çiğdem Sk. No:1 Ağaoğlu My Office
Kat:10 D:44-45 34746 ATAŞEHİR - İstanbul
Kazıyatağı, V.D. 752 066 9584 Tic. Sic. No: 0909

YUSUF DENİR

Geliştirme / Ruhsatlandırma Müdürü
Sumitomo Chemical Turkey
Kimya San. ve Tic. A.Ş.



ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

14 Temmuz 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FİYAT



SUMITOMO CHEMICAL

**Sumitomo Chemical Turkey Kimya
Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

ZOOM 10 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	10B	Akarisit (Kırmızı Örümcek ilacı)
-------	-----	-------------------------------------

110 g/L Etoxazole

Bağ iki noktalı kırmızı örümcek: Yayılış gösterdiği bağ alanları gözlem altında tutulmalı, bir yaprakta 5-8 adet zararlı bulunduğu kimyasal mücadele önerilir. Birinci uygulamada kullanılan ürünün etki süresi bitiminden itibaren yapılan sayımlarda, zararlı yoğunluğu eşşğin üzerine çıkarsa ikinci uygulama yapılır. Hasattan önce yapılan uygulamalarda, kullanılan akarisit beklemeye süresi dikkate alınarak uygulamaya son verilir. Şayet zarar devam ediyorsa hasattan sonra da uygulama yapılabilir.

Çilek iki noktalı kırmızı örümcek:

Erken dönem uygulaması: Kırmızı örümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında çilek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeye başlamadan önce) kırmızı örümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.

Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu – Nisan başı), 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızı örümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Özellikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulanması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yapraklık incelenir. Yaprak başına 15 ve üzerinde kırmızı örümcek tespit edilmedi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

Mısır iki noktalı kırmızı örümcek: Mısırdaki dane bağlama döneminde önce bitkinin alt yapraklarında renk değişimi (sararma veya kahverengileşme) başlamışsa ve zararlı yüksek yoğunlukta ise ilaçlama önerilir.

Şeftali ve nektarin iki noktalı kırmızı örümcek: Mayıs ayından itibaren 100 yaprakta yapılan sayımlarda ortalama yaprak başına 8-10 adet canlı birey bulunduğu ilaçlama yapılır.

Turunçgil kırmızı örümcek: 10 yaprakta yapılacak sayımlarda 9 ve üzeri canlı birey görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Uygulamalar çiçeklenmeden önce yapılmalı bu dönem geçirilmiş ise meyve bağladıktan bir hafta sonra yapılmalıdır.

ZOOM 10 SC hakkında bir şikayetiniz olması halinde il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

ZOOM 10 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 10B olarak sınıflandırılmış bir akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlama uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ZOOM 10 SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 10B hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİLEBİLİRLİK DURUMU: Alkali özellikler hariç, diğer insektisit, fungisit ve yaprak gübrelere karıştırılabilir. Uygulama için, çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



14 Temmuz 2026

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İL VE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İL VE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İL VE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

SUMITOMO CHEMICAL TURKEY
Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Barbaros Mah. Çiğdem Sk. No:1 Ağaçlı My Office
Kat:10 D:44-45 34746 Ataşehir - İstanbul
Koşuyolu V.D. 782 066 9584 Tlc.Sic. No: 8909

YUSUF DEMİR
Geliştirme & Ruhsatlandırma Müdürü
Sumitomo Chemical Turkey
Kimya San. ve Tic. A.Ş.