



İnnal Tarhi

Son Kullanma Tarhi

Sıri Numarası

Ribat Tarhi ve Numarası

: 19.02.2010 / 7567

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma ağlunduna karla, balyeçey temsil edenek 100 yaprak buketinde, epidemis içine girmiş

veya ağ omur 4 larva kütüsü içesine uygulama yapılmaktadır.

Elma içkuru mücadeledeinde nedef, her döte arı larva

çıkış sürecinde ağlarla ilaçlı bulundurarak, yumurtadan gelen larvaları meye içine girmeden

önce öldürmektir. Armut ve myrsus tattının ve erken uyuyan sistemde dikkate alınır.

Meyve kahverengi akarına karla, mayas ayndan ibareen, 100 yaprak periyodik olarak

yapılacak sayımında, yaprak busya ortalaması 8-10 adet brey geçmesi durumunda uygulama

yapılmalıdır.

Elma yeşil yapraklısına karla, vejetasyon altince 100 sığrigünde 5 bulaklık

gördüğünde uygulama yapılmaktadır.

Elma gri yapraklısına karla, karla pembe torunçuk veya çiçek taç yaprakları dokunuşu

dönemiinden poplasyonu 3/4'ü kanat forma dönüşmesiye kadar 100 sığrigünde 2 bulaklık

çiçek buğası veya 1-3 koloni görüldüğünde uygulama yapılmaktadır.

Kırmızı gül yapraklı bitime karşı pembe torunçuk veya çiçek taç yaprakları dokunuşu

dönemiinden poplasyonu 3/4'ü kanat forma dönüşmesiye kadar 100 sığrigünde 5 bulaklık

stırırmak veya 5-10 koloni görüldüğünde uygulama yapılmaktadır.

Şeftali güvenle karla uygulama zamanının süphesinde egesel çiçekler tuzaklar, etkili

stıraklıklar toplam ve bitki fenolojisinden yararlanır.

Pitroses bögüne karla, ortalamada 14-15 °C ve ılığında tarlaya Losengerleri

istikametinde gürleresk, oacaklarda zararlınam yemurca, larva ve ergini aramı. Herhangi bir dönemine

rastlamasa o tarlannı bulساık olduğu gösterir. Birinci döle karla uygulama yapılmakta,

büklerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönen) gördüğünde yapılmaktadır. İkinci döle uygulama yapılmakta,

yarınlarda yemurca yumurta aylamasının tamamlanması beklenmektedir. Bu dönemde de

böcek yemurcanın başlı olarak meydana gelebilcek zararlık iantından töre

edebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bantlara birlikte, yaman urasılmalar sonucunda

patates bitkisinin yapraklısına patates beşçigim %20 ömründeki zarar, bükli

tarafından tolore edilebilirken ve türünde azaltma olumaktadır. Bu taran bitkinin fenolojik

döneme uygulama gelismeine bağlı olarak %40'a kadar çökükacaktır.

Armut Psilliğine karla kişlayan dolı ergenlerin birliği yemurcanın hemen hemen tamamını

çırıp, 2 ve 3. dösem nüfusu görüp uygulayıcı başladıkları stırırmaların %1'si şen fazlasında bulagna

görülmeye başlandığı, tatlmas içinde akutizm başlamadığı ve doğal düşmanların fazla

bütünlüğünü zanneden bin uygulama yereti olabilir.

Aterfesto Psilliğine karla hafiflik olarak 100 bilesik yapraka yapılan sayınlar sonucu

yapıklı bayra 20-30 numu görüldüğünde, yumurtaların köyük yoğunluğu açılığında ve ikinci ergin

parazitlerin çıkış ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka fümmijin olmadan önce uygulama yapılmaktadır.

Zeytin güvenle karla, zeytin güveninin çiçek dönütide, yogan, avuç ve parazitlerin

bulundukları. Bu yıldızın bu dönemde uygulama yapılmıştır tavaşive edilmektedir. Tercihen

sadece mevcut dolu karla uygulama yapılmaktadır. Kontrol edilen mercimek büyüklerindeki

misyonelerin %10unda canlı yumurta-larva olmasi halinde uygulama yapılmaktadır.

DİRENG İLGİ İLÇESİ:

Burco 50 WP adlı bitki koruma tırını, ekli mekanizmasına sahip bitki koruma tırınının tozeturanın

bir neslidir. Aym etki mekanizmasına sahip bitki koruma tırınının tozeturanın

uygulanmasının direk gelisimini teyik etmektedir. Bu nedenle, direk gelisimini geciktirmek

için Burco 50 WP'in ayni üretim sezonu içerisindeki tırının tozeturanın uygulamasını

aspayınız. Uygulamanın tekniklerini gerçekleştirip durrumlarda ise, farklı etki mekanizmasına

sahip bitki koruma tırınının (Grup 1B harcı) kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞA BİTLİKLİK DURUMU:

Yüksek astı veya alkali karakterli bitki koruma tırıları ile karışraz. Amaçlı diğer bitki koruma

ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

## AMC-TR TARIM SAN. ve TİC. A.Ş



## BARCO 50 WP

### İSLANABİLİR TOZ (WP)

GRUBU	1 B	İNSEKTİSIT (Doğek İlacı)
		Aktif Madde: Phosmet, %50

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Genel Bilgiler: Karza hanlınde ya da kandırızı iyice hissetmediginizde,

derhal ibbi yardım isteyin (mümkinse enflerini gesterin).

Solunum: Manz kalan kişiyi temiz havaya çekin. Herhangi bir

rabatzığın devamlı halinde, doktora başvurun.

Yutma: Herhangi bir rabatzığın devamlı halinde, doktora başvurun.

Ciltle temas: Genel olmak üzere cilti tarhis etmez.

Gözlerle temas: Aşık gözler akıcı suyun altında birkaç dekkika yıkayın.

Herhangi bir rabatzığın devamlı halinde, doktora başvurun.

### ANTİDOTTU VE TEDAVİSİ:

Semptonlara göre tedavi uygulayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (ÜZEM) Tel: 114

**BURCO İMŞEK**  
SAHİYİ VE TİC. A.Ş.  
Sakarya  
Şiratlı Yürek Mühendisi  
Dr. Yavuz BAŞRAM  
Genel Müdür Yerelmezi Vodoo

13 Mart 2020  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
KARŞA BİTLİKLİK DURUMU:  
Yüksek astı veya alkali karakterli bitki koruma tırıları ile karışraz. Amaçlı diğer bitki koruma

Net Miktarı :  
Azami Perakende Satış Fiyatı :

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl  
süre ile tırmın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde  
boşluğu (tolerans) şartları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajlarında satılık kaydı  
ile imalatçıların ilaçlarının kalitesinin garantisi ederler. İmalatçılar  
içlerinin hatalı depolamasi veya istabki veya tarsiveler  
uyandıktı okşılık notecinde vaki olacak zaman için  
sorumluluk kabul edmezler.

ÜRETİCİ FİRMASI:

GOWAN CROP PROTECTION LIMITED

Highlands House Basingstoke Road,

Spencers Wood, Reading, Berkshire

RG7 1 NT İNGİLTERE

Frehim Tesisi: SBM Formulation

Zl Avenue Jean Foucault 34535 Beziers, Cedex, FRansa

RİHAT SAHİBİ:

AMC-TR TARIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Çağlayan Mh. Barmaklar Bulvarı Şehitka Polat Apt.

No: 41 / 2, ANTALYA - TÜRKİYE

Tel: + 90 242 3241315 Fax: + 90 242 3241969

[www.amc-tr.com](http://www.amc-tr.com)



TURUMLAR V.D.: 781 019 6358