

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 14.12.2021/12173

KULLANILACAKI BİTKİLER VE DOZLARI:

Kültür Bitkisi	Uygulama Şekli ve Dönemi	Doz
Sofralık Çekirdeksiz Üzüm	1. Uygulama: Çiçeklenmeden önce salkımlar 4-8 cm boyda iken. Salkımların boyunu uzatmak amacıyla. 2. Uygulama: Tam çiçeklenme döneminde yani çiçek taç yapraklarının %70-80'ninin döküldüğü devrede dane seyreltmesi amacıyla 3. Uygulama: Çiçeklenmeden sonra daneler 3 mm sacma iriliğine ulaştığında dane irileştirmesi amacıyla	2 tablet/100 lt su
Kurutmalık Çekirdeksiz Üzüm	Çiçek kapstillerinin dökülmesinden 4-5 gün sonra verimi arttırmak için	1 tablet/100 lt su
Mandarin	Satsuma ve Clemantin çeşitlerinde çiçek dökümünü azaltmak, meyve tutumunu arttırmak ve verim artışı sağlamak amacı ile çiçeklerin %75-80 açtığı devrede	1,5 tablet/100 lt su
Portakal	Yafa portakallarında Haziran dökümünü önlemek için çiçek açımının tamamlanmasından 4-5 hafta sonra Washington Navel çeşidinde meyvelerin ağaçta kalma süresini uzatmak ve hasadı düzenlemek amacı ile meyvelerde renk değişiminin başladığı devrede	2 tablet/100 lt su 1-2 tablet/100 lt su
Limon	Meyvelerde ilk renk değişimi görüldüğünde. Meyvelerin ağaçta 2-3 ay kalmalarını sağlamak amacı ile	1 tablet/100 lt su
Greyfurt	Meyve kabuğunda çürüme, bozulma ve yumuşama olmadan hasadı geciktirmek amacı ile meyvelerde ilk renk değişiminin görüldüğü devrede	1 tablet/100 lt su
Armut	Meyve tutumu az olan armut çeşitlerinde verimi arttırmak için çiçeklerinin % 30'unun açtığı devrede Ayrıca çiçeklenme zamanında meydana gelebilecek don zararlarından korunmak için donlardan en geç 2 gün sonra hazırlanan solusyon ağaçlara püskürtülür.	1,5-2 tablet/100 lt su
Kiraz ve Vişne	Hasadı geciktirmek, iri ve parlak daneler elde etmek amacı ile renk değişiminin başladığı dönemde	1-2 tablet/100 lt su
Şeftali ve Nektarin	Ağustos ayının ilk haftasında yapılacak bir uygulama, bir sonraki yılın çiçek açımını 3-7 gün geciktirmekte ve şeftalilerin ilkbaharın geç donlarından zarar görmesini engellemektedir.	1,5 tablet/100 lt su
Çilek	Ana bitki 1-6 yapraklı iken, fideliklerde ana bitkinin verdiği genç sürgünlerin çoğaltması için. Ayrıca çileklerde mahsülle yatmayı sağlamak, verimi arttırmak ve meyveleri irileştirmek için çiçeklenmeden 3-4 hafta önce	5 tablet/100 lt su
Enginar	Hasadı 1-2 ay erkene almak, düzgün şekilli ve iri ürün elde etmek amacı ile bitkilerin 4-5 yapraklı ve yaprak boylarının 20-30 cm olduğu devrede özellikle bitkilerin göbek kısmına	2,5-5 tablet/100 lt su
Patates	Tohumluk patatesler dikilmeden önce FLYBE ile hazırlanan solüsyona daldırılır ve dikilir, böylece hızlı ve düzenli çıkış sağlanır.	2 tablet/100 lt su
Marul	Göbek bağlamayı teşvik için hasattan 7-15 gün önce	2 tablet/100 lt su veya 1 tablet/da
Biber	Verimi arttırmak için çiçeklerin yarısı meyve tuttuğunda ve bundan 2-3 hafta sonra	3 tablet/100 lt su
Süs Bitkileri	Kesme çiçekçilikte uzun sap ve iri çiçek elde etmek amacı ile krizantem, gül, siklamen ve karanfilde	4-15 tablet/100 lt su

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

Kalibrasyon:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

AMC-TR TARIM SAN. ve TİC. A.Ş.



FLYBE

Suda Çözünen Tablet (ST)

GRUBU	---	BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ
-------	-----	---------------------------

Aktif Madde: 1 g/tablet Gibberellic acid

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜREYLE İNSAN VE/VEYA HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKLİDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma: Daha fazla maruz kalmaktan kaçının. Hemen temiz havaya çıkın. Nefes almıyorsa suni teneffüs yapın. Nefes almakta güçlük çekiyorsa oksijen verin. Tıbbi yardım alın.
Yutma: Hemen tıbbi yardım alınmalıdır. Doktor tarafından belirtilmediği sürece kusturmaya çalışmayınız. Kusma meydana gelirse, baş aşağıda tutulmalıdır. Bilinci yerinde olmayan kazazedeye ağız yolu ile herhangi bir şey verilmemelidir. Kazazedenin bilinci yerinde ve tetikte ise 2-4 bardak süt veya su verin.
Ciltle temas: Vücut ürüne temas ederse bol su ve sabun ile 15-20 dakika yıkayın ve uygun bir cilt temizleyici kullanın. Kirli giysileri akan suyun altında hemen çıkartın. Yeniden kullanmadan önce giysileri yıkayınız.
Gözlerle temas: Gözleri, göz kapaklarını açık bir şekilde 15-20 dakika boyunca zaman zaman alt ve üst göz kapaklarını kaldırarak ılık su ile yıkayınız. Gözlerinizi ovmayın. Hemen tıbbi yardım alın.

ANTİDOT VE TEDAVİSİ:

Semptomları gözetilerek tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel : 114



Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

İÇİNDEKİLER
Gibberellic acid

ZARARLILIK İŞARETLERİ: -

UYARI KELİMESİ: -

ZARARLILIK İFADELERİ: -

ÖNLEM İFADELERİ:

P280: Koruyucu eldiven /koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P501: İçeriği/kabı bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT

EDİLECEK HUSUSLAR:

Arlara zehirlidir.
Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
İlacı serin, kuru ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
Kullanılmış boş ambalajları başka bir amaç için kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
Boş kapları usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU :

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde oluşabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmezler.

Burhan ŞİMŞE!
Ziraat Yüksek Mühendisi

AMC-TR TARIM
SANAYİ TİC. A.Ş.
Çarşı Mah. Barınaklar Bulvarı
Sıkırtı Pazarı Apt. No 41/2 ANTALYA
Tel: 0 242 324 13 15 Faks: 0 242 324 19 69
KURUMLAR V.D. 781 019 6958

03 Temmuz 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

39

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası:

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Tavsiye edilen miktardaki FLYBE tablet önce 100 ml'den az olmayan bir miktar su içerisinde eritilir ve bu eriyik gerekli miktar suya ilave edilip karıştırılır. Greyfurt dışındaki kültür bitkilerinde iyonik olmayan bir yayıcı yapıştırıcı ile birlikte kullanılması tavsiye edilir. Suda kolayca hidrolize olduğundan hazırlanan solüsyon bekletilmeden kullanılmalıdır.

FLYBE hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diger bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

AMC-TR TARIM SAN. ve TİC. A.Ş



FLYBE

Suda Çözünen Tablet (ST)

GRUBU	—	BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ
-------	---	---------------------------

Aktif Madde: 1 g/tablet Gibberellin acid

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

ÜRETİCİ FİRMA

AMC XINJIANG CO., LTD.
Room A2313, NO.1 Of Shanghai Building, No. 430
East Hebei Road, High-Tech Industrial Development
District (New Area), Urumqi City, Xinjiang Province, P.R. ÇİN

Üretim tesisi:

BAICAO BIOTECH CO., LTD.
Weisan Road, Yanjin County, Henan Province, ÇİN

RUHSAT SAHİBİ ve İTHALATÇISI:

AMC-TR Tarım San. ve Tic. A.Ş.
Çağlayan Mh. Barınaklar Bulvarı Sıdika Polat Apt.
No: 41 / 2 ANTALYA - TÜRKİYE
Tel : + 90 242 324 13 15 Fax : + 90 242 324 19 69
www.amc-tr.com



03 Temmuz 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

39

Burban ŞİMŞEK
Ziraat Yüksek Mühendisi

AMC-TR TARIM
SANAYİ TİC. A.Ş.
Çağlayan Mah. Barınaklar Bulvarı
Sıdika Polat Apt. No: 41/2 ANTALYA
Tel: 0 242 324 13 15 Faks: 0 242 324 19 69
KURUMLAR V.D.: 781 019 6358