

İthal Tarihi

Son Kullandırma Tarihi

Satf Numarası

Rühsat Tarihi ve Numarası

: 23.11.2007 / 6182

KULLANILACAGI BITKI VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitti Adı	Zararlı Organizmamı Adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Elma	Kanaklıcık ( <i>Fenneria marginata</i> )	800 g/100 L su da siliceası varsa 400 g/100 L su da siliceası yoksa	21 gün
Armut	Kanaklıcık ( <i>Fenneria marginata</i> )	400 g/100 L su da siliceası varsa 400 g/100 L su da siliceası yoksa	21 gün
Kavşayı	Seri çekiksi meyvelerde yaprak delen ( <i>Myconeces coryophiliius</i> )	400 g/100 L su normal dozem 800 g/100 L su dormant dozem	21 gün
Sefali	( <i>Wittonomyces carpophilus</i> )	800 g/100 L su 1. uygulama 400 g/100 L su 2. uygulama	21 gün
Erik	Çep hastalığı ( <i>Tephritis conura</i> )	800 g/100 L su	21 gün
Antep karpığı	Kanaklıcık ( <i>Phylloxeracognata pistaciae</i> )	500 g/100 L su	21 gün
Turuncigil	Uç kurumun ( <i>Thraumia trachysiphon</i> )	400 g/100 L su	21 gün
Zeytin	Hababılık leke ( <i>Cyphacoccus oleagineum</i> )	800 g/100 L su	21 gün
Mahmudi	( <i>Phasmagora villosula</i> )	300 g/100 L su 1. uygulama 500 g/100 L su 2. uygulama	21 gün
Badem*	Antrenç (içindekili) ( <i>Elattone amputina</i> )	300 g/100 L su 1. uygulama 500 g/100 L su 2. uygulama	21 gün
Pitatus	Mahmudi* ( <i>Phyllophaga infectoria</i> )	300 g/100 L su	14 gün
Damates	Bakteriyel bacak ( <i>Pseudomonas syringae pv. Tomato</i> )	300 g/100 L su 1. uygulama 400 g/100 L su 2. uygulama	14 gün
Fasulye	Bakteriyel leke ( <i>Anthrobium veronicae</i> )	300 g/100 L su 1. uygulama 400 g/100 L su 2. uygulama	14 gün
Dontates	Mahmudi ( <i>Phyllophaga infectoria</i> )	300 g/100 L su	14 gün
Patates	Antrobuz ( <i>C. solani</i> in <i>Indumentosum</i> )	300 g/100 L su	14 gün
Yaprak	Adı Yaprak yankılığı ( <i>Kantharidus aconopholis</i> sp. <i>phoenicelli</i> )	300 g/100 L su	14 gün
Hıza Yankılığı	Hıza Yankılığı ( <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phoenicoli</i> )	300 g/100 L su	14 gün
Patates	Erken yaprak yankılığı ( <i>Alternaria solani</i> )	500 g/100 L su	14 gün
Yer Fıstığı	Sekşespara etken yaprak lekesi ( <i>Cercopis orobanchivora</i> )	400 g/100 L su	14 gün
Sbzze	Cökerten ve kök gürültüğü ( <i>Rhizobium</i> spp., <i>Rizocetoma</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.)	300 g/100 L su 1. uygulama 500 g/100 L su 2. uygulama	14 gün
Fidekleri	Alternaria spp., <i>Sclerotinia</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp.	(fiddeki uygulaması)	14 gün
Hıyar	Köpek yaprak lekesi ( <i>Syringae</i> sp. <i>laeteviridis</i> )	100 L su <i>(Pseudomonas</i> spp.)	Dekar***
Kornison	300 g/100 L su	150 gda***	14 gün
Serbetciozu	Mahmudi ( <i>Pseudoperonospora humuli</i> )	500 g/100 L su	14 gün
Aspir	Yaprak lelesi ( <i>Alternaria cornifolia</i> )	300 g/100 L su	14 gün
Tütün	Fıstıkdere çobanı ( <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizom</i> spp., <i>Alternaria</i> spp., <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )	400 g/100 L su	14 gün

\* Tüketicimizin anadolu başlı yapraklı hasadı yapılıcak başlı alanlarında kullanılması.

AMC-TR TARIM SAN. ve TiC. A.S



AMC-TR

Net Miktarı Azami Perakende Satış Fiyatı :  
ICİNDEKİLER Meatalık Bakır eşdeğer Bakır oksitlerdir

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:  
ZH400: Suçlu ortamda olsakta çok toksik

ÖNLEM İFADELERİ:  
PH103: Kullanmadan önce etkeni okyanusda kullanın.

ZH37: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeymiz, içmemiz, sigara kullanmamız.

PH270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeymiz, içmemiz, sigara içmemem.

PH273: Cevreye salınırılığinden kaçının.

PH280: Konteynici eldiven/konvansiyon konyucu/konyucu kullanın.

PH284: Sollanın konteynici gormin.

PS91: Dokumaları toplayın.

PSU401: İğne/kâh betafal edin.

PHU401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talmadırma uyarın.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN

DİKKAT EDILECEK HÜSUSLAR :

Ariyan zehiridir. Çıraklımeye zamanın kullanılmamız.

Balklara zehirlidir. Yeraltı ve yeraltı su kaynaklarına bulgutulmamız.

Beyaz ilçede ambalajlarını usulune uygun inha ediniz.

başka amacılara için kullanılmamız. Ambalajında kaplı olarak muhafaza ediniz.

**BİTTİĞİM SİVİLEŞEK**  
Ziraat Mısrak Mühendisi

**AMC-TR TARIM**

**SANAYİ VE TİC. A.S.**  
Çağlayan Mah. Bulvarı  
Sıhhiye Polat Apt. No: 4/12 ANTALYA  
Tel: 0242 324 33 15 Faks: 0242 324 19 00  
<URUMLAR VD.: 781 019 6358

TARMİ VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR





**Bağ müdürlüğü: 1. uygunluk** Sürüş boyu 25-10 cm uzunluğunda olunca uygulanmalıdır  
2. ve diğer uygunluklar: İlk uygunlamadan 15 gün sonra yapanımlıdır. Belirilen güvenlik standartları  
ortamda, nemi, nem, gibi meteorolojik faktörler etkileye alınamaz. Belirtilen güvenlik standartları  
olşusunda uygunluklar yelpizdir. Koşular ortadan kaldırıldığından uygunlamlara son verilmelidir.

AMC - TR

GRUBL	M:1	FUNGISIT (Mantar [iac])
-------	-----	-------------------------

%50 Metalik Bakır eşdeğer Bakır oksiklorid

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

uygulamaları, fielefice veya urduyla hastalıkların belirtileri görülmeli, konuyucu olarak fide döneminde hafifde, karada ise 10 gün boyunca 2-3 kez uygulana yapılmalıdır.  
**Pantazis midefüze:** hastalık çıkışında çok yüksek nem gibi klima koşulları olduğunda veya çevrede İLK hastalık belirtilerinin göründüğü ve uygulama sağlanması ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla uygulana teklahamur. En fazla aralıklarla 10 gün. Voredice İLK hastalık belirtilerinin göründüğünde bu şekilde uygulamaları başlatalmalıdır. Hastalığın şiddeti, ictimai koşullar ve birlik komuna unutmanın etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bükümün türmen yesili akşamının hasarlanmasına özen gösterilmelidir.

**4.5 hâlin sonra başlanır, hasada kadar devam edilir.**  
**Sözde fidelerde ekberken ve kök cırıklığından:** (Yugularmlar tohum ve toprak ilaçlanması şeklinde yapılır.)  
Tohum ilaçlanması: Ekmenden önce ekenden sonra fidelerden toprak vazıne ekberinden sonra ve fidelerden sonra ekmenden önce ilaçlanır.  
Tohum ilaçlanması: Ekmenden önce ekunden sonra fidelerden toprak vazıne ekberinden sonra ve fidelerden sonra ekmenden önce ilaçlanır.

**Hıyar** Kornisian köşel yaprak, lekesi<sup>1</sup>, urfa'da gelistirilen once veya ilk gorunmeye baslandiginda  
koyucu olursa 10-15 cm ile 1-2 cm uzugulma gelistirebilmektedir.<sup>2</sup>  
**Serbetciotus militaris**: İlkkatman sanguifer oraklana 75-100 cm oldugundan itibarlayarak baslanır Çilek donecine  
gorenecegimizde 10-15 cm uzunluğunda ve 1-2 cm çapinda olur.

**Tütün İdeolojisi**: Çoğunlukla, tütün konusundaki bilgi ve görüşlerin, tütün tüketimini destekleyen, tütün tüketimini artırıcı, tütün tüketimini onaylayan ve tütün tüketimini teşvik eden bir ideolojiye dayanır.

OXICRON 50 adult bitki koruma

Aynı etki mekanizmasının sahip olduğu konuma underlerin tek-ardayın uygulamaları direk gelişimin teşvik etmektedir. Bu nedenle direkt gelişiminin gerçekleştirileceğinden **ONICKON 50-mm**'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısının artmasına ve uygulamaların teknik olarak gerekli olduğundan ise farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup M:** hedefi) bükü konuma underlerin kullanımına özen gösterilmiştir.

Diger biki koruma ununleri ile karismaz.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
DA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

A circular blue ink stamp with a double-line border. Inside the border, the word 'MUDURLUK' is written vertically along the right edge, and 'MUDUR' vertically along the left edge. In the center of the stamp, the name 'Umit Ugur BAHCE' is printed in capital letters, with 'Daire-Baskan V.' written below it.

**Burhan GIMSEK**  
Ziraat Üniv. Mühendisi  
~~AMS-TEK TARIM SANAYİ TIC. A.Ş.~~  
Cağlayan Mah. Büyükkıralı Bulvarı  
Sıhhiye Belediye Apt. No: 4112 ANTALYA  
Tel: 0242 324 13 15 Faks: 0242 324 19 69  
KURUMLAR V.D.: 781 019 6358