



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	AMC-TR TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	135
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	2026TK14746
Marka veya Ticari Adı (varsa)	GERMI PLEX 2.4-6.7-7.6
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	AMC-TR TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:2,4 Amonyum N:2,4 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅) %:6,7 Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O) %:7,6
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 5 - 9,5 - 10 - 20 L 1,22 - 6,1 - 11,59 - 12,2 - 24,4 kg
Depolama Sıcaklığı	0 / 45 °C
Diğer İşaretler	Lisans ve Tescil No Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Son Kullanma Tarihi Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Net Ağırlık Parti No Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Parti Seri No Üretim Tarihi Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi
Veriliş Nedeni	Diğer
Bu belge 03/08/2026 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:02/10/2026

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ VE MİKTARI:

Bitki	Yapıktan Uygulama (100 L su)	Damlama ile Uygulama (Dekar)	Uygulama Zamanı
Sera sebze (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan vb.)	75-150 ml	1-3 lt	Çiçeklenme öncesi ve meyvenin erken gelişim döneminde
Açık alan sebze	75-150 ml	1-3 lt	Çiçeklenme öncesi ve meyvenin erken gelişim döneminde
Yaprağı yenen sebze (Marul, Brokoli, Kereviz, Ispanak vb.)	75-100 ml	1-3 lt	Vejetatif büyüme döneminde her 15 günde bir uygulama.
Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek	75-100 ml	1-3 lt	Çiçeklenme öncesi ve meyvenin erken gelişim döneminde
Yumurulu bitkiler (Patates, Soğan, Sarımsak, Havuç vb.)	75-100 ml	1-3 lt	Yumurta oluşumu öncesi ve Yumurta başlangıcında
Bağ	100-150 ml	1-3 lt	Çiçeklenme öncesi ve meyvenin erken gelişim döneminde
Turunçgil, Muz, Fındık, Zeytin	100-200 ml	1-3 lt	Çiçeklenme öncesi ve meyvenin erken gelişim döneminde
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Kiraz, Vişne, Badem vb.)	100-150 ml	1-3 lt	Çiçeklenme öncesi ve meyvenin erken gelişim döneminde
Avokado	100-150 ml	1-3 lt	Çiçeklenme öncesi ve meyvenin erken gelişim döneminde
Antep fıstığı	100-150 ml	1-3 lt	Çiçeklenme öncesi ve meyvenin erken gelişim döneminde
Hububat	75-100 ml	1-3 lt	Çiçeklenme öncesi ve meyvenin erken gelişim döneminde
Pamuk	50-100 ml	1-3 lt	Çiçeklenme öncesi ve meyve gelişim döneminde
Endüstri Bitkileri (Aycıçeği, Mısır, Soya, Tütün, Şeker Pancarı, Yer Fıstığı)	50-100 ml	1-3 lt	Vejetatif büyüme döneminde her 15 günde bir uygulama.
Tarıla Bitkileri (Buğday, Arpa, Çeltik, Nohut, Mercimek vb.)	50-100 ml	1-3 lt	Çıkış Sonrası ve Vejetatif büyüme döneminde 15 günde bir uygulama

EC FERTİLİZER

NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GERMİ PLEX

2.4-6.7-7.6

GARANTİ EDİLEN İÇERİK (w/w):

Toplam Azot (N):	% 2.4
-Amonyum Azotu:	% 2.4
Suda çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅):	% 6.7
Suda çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O):	% 7.6

UYARILAR

- Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Gübrerin deriye ve elbiselerinize bulaşmamasına dikkat ediniz.

- Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.

- Tıbbi yardım alınız.
- Yutmayınız. Teneffüs etmeyiniz.
- Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.

- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- Kullanımdan sonra kıyafetlerinizi ve ellerinizi yıkayınız.
- Güneş ışığının gücü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- Yiyecek, içecek ve yerlerden uzak tutunuz.



Net Ağırlık: kg
Hacim : lt

DEPOLAMA:

Depolama Sıcaklığı: 0/ 45°C olmalıdır.
Toprak ve/veya Yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

KARIŞILIRLIK

Bakırli Preparatlar ve yağlar haric tavsiye dozlarında karıştırılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ve yaprak gübreleri ile karıştırılmadan önce küçük çaplı ön deneme yapılması tavsiye edilir.

TAAHHÜTNAME:

Piyasaya sunacağımız ürünün etiketin aynı olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 7223 sayılı Kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

Üretici Firma:

COSMOCEL SA

Via Matamoros 1501 San Nicholas de los Garza
Nuevo León MEXICO CP 66480

Tel : + 5281 8625 3100

Faks : + 5281 8625 3119

İthalatçı Firma:

AMC-TR TARIM SAN VE TİC. A.Ş.

Çağlayan Mah. Barnaklar Bulvarı

Sıdika Polat Apt. No: 41 / 2

ANTALYA / TÜRKİYE

Tel : + 90 242 324 13 15

Faks : + 90 242 324 19 69

www.amc-tr.com

Burban ŞİMŞEK
Ziraat Müksek Mühendisi

AMC-TR TARIM
SARILIRMA TİC. A.Ş.

Çağlayan Mah. Barnaklar Bulvarı
Sıdika Polat Apt. No: 41/2 ANTALYA
Tel : +90 242 324 13 15 Faks: 0 242 374 19 69
E-posta: info@amc-tr.com

UYARILAR

- Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Gübrenin deriye ve elbiselerinize bulaşmamasına dikkat ediniz.

• Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.

- Tıbbi yardım alınız.
- Yutmayınız. Teneffüs etmeyiniz.
- Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- Kullanımdan sonra kıyafetlerinizi ve ellerinizi yıkayınız.
- Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulamayamayınız.
- Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.

DEPOLAMA:

Depolama Sıcaklığı: 0/ 45°C olmalıdır.

Toprak ve/veya Yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

KARIŞILIRLIK:

Bakırli Preparatlar ve yağlar hariç tavsiye dozlarında karıştırılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ve yaprak gübrelere ile karıştırılmadan önce küçük çaplı ön deneme yapılması tavsiye edilir.

TAAHHÜTNAME:

Piyasaya sunacağımız ürünün etkinin aynısı olacağını taahhüt ederiz. Akşının tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

EC FERTİLİZER NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GERMİ PLEX

2.4- 6.7- 7.6

GARANTİ EDİLEN İÇERİK (w/w):

• Toplam Azot (N)	%2.4
- Amonyum Azotu	%2.4
• Suda Çözünür Fosfor Oksit (P ₂ O ₅)	%6.7
• Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%7.6



Üretici Firma:
COSMOCEL SA
Via Masenore 1501 San Nicolas de los Garz
Nuevo Leon MEXICO CP 66480
Tel : +5281 8625 3100
Faks : +5281 8625 3119

İthalatçı Firma:
AGCIR FİDAM SAN VE TİC. A.Ş.
Cemalpaşa Mah. SSK Sok. B Blok Kat: 3
Sakarya Pk. No: 41/2
AYTAYVA/TÜRKİYE
Tel : +90 242 324 13 15
Faks : +90 242 324 19 89
www.agcir.com

Net Miktar: 1.4 Kg
Hacim: 1 L

BİTKİ	Yapraktan Uygulama (100 L su)	Damlalı Sulama (Dekar)	Uygulama Zamanı
Sera sebze (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan vb.)	75-150 ml	1-3 lt	Çiçekleme öncesi ve meyvenin erken gelişim döneminde
Açık alan sebze	75-150 ml	1-3 lt	Çiçekleme öncesi ve meyvenin erken gelişim döneminde
Yaraglı yeren sebze (Marul, Brokoli, Kereviz, Ispanak vb.)	75-100 ml	1-3 lt	Vejetatif büyüme döneminde her 15 günde bir uygulama.
Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek	75-100 ml	1-3 lt	Çiçeklenme öncesi ve meyvenin erken gelişim döneminde
Yemlik bitkiler (Patates, Soğan, Samanık, Havuç vb.)	75-100 ml	1-3 lt	Yumur olgunluk öncesi ve Yumur bağlanmasında
Bağ	100-150 ml	1-3 lt	Çiçeklenme öncesi ve meyvenin erken gelişim döneminde
Turuncgöl, Akçık, Zeytin	100-200 ml	1-3 lt	Çiçeklenme öncesi ve meyvenin erken gelişim döneminde
Meyve Ağacı (Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayra, Kiraz, Vişne, Badem vb.)	100-150 ml	1-3 lt	Çiçeklenme öncesi ve meyvenin erken gelişim döneminde
Avokado	100-150 ml	1-3 lt	Çiçeklenme öncesi ve meyvenin erken gelişim döneminde
Anfep istifiği	100-150 ml	1-3 lt	Çiçeklenme öncesi ve meyvenin erken gelişim döneminde
Hibiscus	75-100 ml	1-3 lt	Çiçeklenme öncesi ve meyvenin erken gelişim döneminde
Pamuk	50-100 ml	1-3 lt	Çiçeklenme öncesi ve meyve gelişim döneminde
Endüstri Bitkileri (Ayıççeği, Mısır, Soya, Tütün, Şeker Pancarı, Yer Fıstığı)	50-100 ml	1-3 lt	Vejetatif büyüme döneminde her 15 günde bir uygulama.
Çiçek Bitkileri (Bülbül, Arpa, Çiçek, Nohut, Mercimek vb.)	50-100 ml	1-3 lt	Çiçeklenme öncesi ve meyvenin erken gelişim döneminde

Saklama: Uzun No: 135
Büyük Tezde No:
Ürün Tezde:
Lot Numarası:
San. Mülküne aittir

